



1



2



3


①ハスモンヨトウ（コーリング中）
②性フェロモン剤処理区内のモニタリングトラップ ③ハスモンヨトウ用性フェロモン剤設置状況



4



5



6


④ハスモンヨトウ用性フェロモン剤設置状況：拡大 ⑤性フェロモン剤＋ブラックライト設置区（施設ビーマン） ⑥性フェロモン剤無処理区（施設ビーマン）



7



8



9

⑦シロイチモジヨトウ（コーリング中）
⑧シロイチモジヨトウ用フェロモントラップ（水盤式） ⑨シロイチモジヨトウ性フェロモン剤処理（施設ネギ）



10







11



12

⑩シロイチモジヨトウ性フェロモン剤処理（露地ネギ） ⑪シロイチモジヨトウ性フェロモン剤処理区 ⑫シロイチモジヨトウ性フェロモン剤無処理区



- ① リンドウ (品種: イーハート・ヴォ)
- ② 葉枯病 (*Septoria* spp.) の被害
- ③ 花腐菌核病 (*Ciborinia* sp.) の初期病徴
- ④ 花腐菌核病による花腐、茎枯れ症状
- ⑤ 灰色かび病 (*Botrytis cinerea*) の花器の病徴
- ⑥ 灰色かび病の芯止り症状

- ⑦ 褐色根腐病 (*Pyrenochaeta* sp.) の被害
- ⑧ モザイク病 (CMV・BBWV) の被害
- ⑨ えそ萎縮病 (BYMV) の被害
- ⑩ 褐斑病 (*Thallosporiella gentianae*) の被害
- ⑪ 炭そ病 (仮称) の被害

関連記事50ページに、
写真提供①: 岩手園試、
②、⑤、⑥、⑧: 赤坂安盛氏、
③、④、⑦、⑨~⑪: 仲谷房治氏