

ベトナムにおける稲作とトビイロウンカの発生

鈴木芳人氏原図(本文19ページ参照)



◀ウンカ類のふるさと(?)
——ベトナム北部紅河デルタ
の深水田で栽培される冬作
の浮稲

植物病原菌の薬剤感受性検定マニュアル(9)

——野菜類炭そ病菌——

楠 幹生氏原図(本文33ページ参照)



①イチゴ炭そ病菌のベノミル感受性検定

培地: 左—ベノミル添加PDA (100ppm)

右—ジエトフェンカルブ添加PDA (100ppm)

検定菌: 左上、左下—*Glomerella cingulata* 感性菌

右上、右下—*Glomerella cingulata* 耐性菌

中上、中下—*Colletotrichum acitatum* (築尾氏より分譲)



②キュウリ炭そ病菌のベノミル感受性検定

培地: 左—ベノミル添加PDA (100ppm)

右—プロシミドン・ジエトフェンカルブ添加PDA(ジエトフェンカルブ濃度で100ppm)

検定菌: 左上、左下—*Colletotrichum lagenarium* 感性菌

右上、右下—*Colletotrichum lagenarium* 耐性菌

連載口絵 花の病虫害(14) シュッコンカスミソウ



- ① シュッコンカスミソウの開花状況
- ② スポット状に発生した苗腐病
- ③ 苗腐病で腐敗した苗の拡大
- ④ 激発した苗腐病
- ⑤ 疫病の発病状況(生育初期)
- ⑥ 疫病の発病状況(開花期)
- ⑦ 疫病の発病部位の特徴
- ⑧ 茎腐病の発病状況
- ⑨ 茎腐病の発病部位の特徴
- ⑩ 斑点細菌病
- ⑪ 黒斑病