


ブルーベリーを加害するオウトウショウジョウバエの防除対策

(本文 21 ページ参照)



①着色ステージ別果実（左から1,2,3,4,5,6）



②ペットボトルで作成した誘引トラップ
(内部に日本酒とハチミツを重量比で
5:1に混合した液を50 ml程度入れる)



③木更田市現地圃場に設置した防虫網



④水浸処理により果実から脱出した幼虫

川瀬 信三氏原図

メボウキ黒斑細菌病(新称), ホワイトレースフラワー軟腐病(新称)

(本文 40 ページ参照)



①メボウキ黒斑細菌病罹病株の茎に形成された暗色水浸状斑。拡大して褐色～黒褐色の条斑を形成する。



②メボウキ黒斑細菌病罹病株の葉脈に形成された
黒色水浸状斑。急速に進展して葉柄に拡大し、
葉柄内部組織は消失する。



③ホワイトレースフラ
ワー軟腐病の罹病
株。地際部の茎に暗
色水浸状の条斑が形
成され、葉柄基部か
ら葉が垂れ下がり萎
凋症状を示す。



④ホワイトレースフラ
ワー軟腐病罹病株の
茎部と葉柄に見られ
る軟化腐敗症状。褐
変・腐敗して萎凋す
る。

兼橋 和央氏原図