

タマネギ白斑葉枯病の発生対応型防除

(本文 15 ページ参照)



①一部の葉が枯死している白斑葉枯病の多発生株



②白斑葉枯病の初発病斑


新村昭憲氏原図

Blueberry red ringspot virus の日本における発生

(本文 31 ページ参照)



①果実の斑入り (岩手県 7 月)



②果実の赤色輪点 (岩手県 7 月)



③果実の斑入り (岩手県 7 月)



④茎の赤色輪点 (岩手県 5 月)

⑤茎の不定形の赤色斑点 (岩手県 7 月)



⑥葉の赤色輪点 (岩手県 10 月)



⑦葉の不定形の赤色輪点 (岩手県 9 月)

磯貝雅道氏原図

気流に依存したナモグリバエの長距離移動

(本文 35 ページ参照)




①ナモグリバエ成虫 (岩崎暁生原図)



②アルコール中のナモグリバエ成虫
(三田村原図)

カンザワハダニによるトマトの葉の萎れおよび果面障害果の発生

(本文 51 ページ参照)



①トマト果面障害果皮において多数観察されたカンザワハダニの口針挿入孔 (▲) と一対の触肢爪跡 (SEM 画像)



②トマト果実に対するカンザワハダニ接種に用いた PP 製保護袋



③カンザワハダニの接種で再現されたトマトの果面障害果



④カンザワハダニ多発生によるトマトの葉のしおれと枯死