

ミヤコカブリダニバンカーの開発

(本文 25 ページ参照)



①ミヤコカブリダニ



②ミヤコカブリダニバンカー (25 リットル)



③ミヤコカブリダニバンカーはビニールマルチに開けた穴の土の上に直接置




④ミヤコカブリダニバンカーを設置したハウス

岡留和伸氏原図

リビングマルチを利用した害虫と雑草の管理技術

(本文 29 ページ参照)



①シロクローバーをリビングマルチに利用したキャベツ栽培



②シロクローバーをリビングマルチに利用したスイートコーン栽培



③ムギをリビングマルチにしたダイズ栽培 (播種 30 日後) ムギが畝間に繁茂して地表面が見えなくなっている。

山下伸夫氏原図

食品の安全性を確保するための麦類赤かび病の防除

(本文 39 ページ参照)



①麦類赤かび病の病徴（左：小麦，右：六条大麦）



②小麦の健全粒（左）と赤かび病被害粒（右）



③大麦（二条皮麦）の健全粒（左）と赤かび病感染粒（右）

中島 隆氏原図

トマト葉かび病菌の寄生性分化機構

(本文 48 ページ参照)



①トマト葉かび病の葉表の病徴



②トマト葉かび病の葉裏の病徴

飯田祐一郎氏原図