


リンゴ園における非選択性殺虫剤散布がナミハダニの発生に及ぼす影響

(本文 5 ページ参照)



口絵① フツウカブリダニ雌成虫



口絵② ミチノクカブリダニ雌成虫



口絵③ ケナガカブリダニ雌成虫

舟山 健氏原図

夏秋ピーマン圃場でのトマト黄化えそウイルス (TSWV) とミカンキイロアザミウマを含めた総合防除の取り組み

(本文 10 ページ参照)



口絵① 圃場内に放置されていた果実残渣。



口絵② 果実残渣に生息していたミカンキイロアザミウマ成幼虫。

岡崎真一郎氏原図

作業用手袋の利用によるピーマンのモザイク病接触伝染の抑制

(本文 46 ページ参照)



口絵① PMMoV によるモザイク症状。




口絵② 誘引ワイヤーに下げた作業用手袋。

注) 手袋は畝ごとの手袋交換を簡便にするため誘引用ワイヤーにつり下げた。

後藤万紀氏原図

北海道におけるリーキ腐敗病の発生と被害軽減対策

(本文 21 ページ参照)



口絵① リーキ腐敗病の病徴

a: 下葉に発病した水浸状病斑, b: 葉鞘部の腐敗による株の枯死,
c: 葉の付傷部から進展した病斑, d: 接種試験で再現された水浸状病斑。

堀田治邦氏原図