整理番号

D－2－1　　207

標 題 名

稲萎縮病試験成績報告　明治２８年

著 者 名

発行者名

岡山県内務部

発 行 年

明治２９年

製作年月

平成２８年６月

NO.
農業試驗場
農商務省

明治廿八年分

稻萎縮病試驗成蹟報告

日植防協
備品（ア）
No. 3311

岡山縣內務部

稻萎縮病試驗成蹟報告

試驗擔任　岡山縣技手岸歌治

萎縮病ノ起元

稻ノ萎縮病ハ岡山縣ノ外カ兵庫縣、大坂府、京都府、滋賀縣等ニモ之レアリ而シテ其被害ノ最モ甚シカリシコトノ能ク世人ニ記臆セラル、モノハ明治二十四年ヨリ明治二十六年ニ至ル間ナルカ如シ其ノ發病ノ起元ニ至リテハ說ク所區々ニシテ未タ何レノ時代ヨリ發生シタルカ深ク探究シタルモノアルコヲ聞カス或ハ明治三年ノ洪水後ヨリ發生シタリト云ヒ或ハ明治七八年頃ヨリ發生シタリト云ヒ或ハ維新前數十年前ニ於テ既ニ發生シタルコアリト云ヒ愈々何レノ時ヲ以テ此病ノ起元トナスヘキカハ未明了ナラス然レモ記者カ明治二十六年靜岡縣伊豆國賀茂郡豆陽學校ニ職ヲ奉シタル當時同郡南中村ニテ開會シ

タル農談會場ニ於テ同村ノ精農山本善太郎氏ト相見シ時氏カ該病發生ノ起元ニ就テ語ル處ニ據レハ今ヨリ七十年前既ニ此病ヲ發生シ爾來引續キ年々多少ノ害ヲ被ラサルコトナケレモ本年ノ如ク甚シキコトナカリシト又磐梨郡石生村藤原健三氏ノ該病ニ關スル說ヲ聽クニ今ヨリ五十年前ヨリ之ヲ發生シタルコトヲ記臆スレモ當時ニ至リテハ其名稱スラモ分明ナラス現時ノ病兆ヲ以テ其萎縮病ナリシコトヲ推想スルノミナリ而メ其ノ被害ノ最モ甚シカリシハ去二十五年及二十六年ナリ其以前ニ在リテハ單ニ卑濕地ニ於テ點々之ヲ見タルノミナリト又御野郡福濱村長ノ說モ數十年前ヨリ此病ヲ發生シタリト云ヘリ以上三氏ノ說ニヨリテ考フレハ其被害ノ多少ハ暫ラク措キ其起元ニ至リテハ或ハ數十年ノ昔ニ在ルヤモ知ルヘカラス故ニ記者カ該病起元探究ノ際聞キ得タル一部分ヲ割載シテ覽者ノ參考ニ供ス

萎縮病ノ多キ土地

此病ノ多ク生スル所ハ何レノ府縣ヲ問ハス多クハ(一)土質ノ如何ニ關セス一般ニ排水惡シキ卑濕地(二)新鮮有機質肥料ヲ多ク施ス處(三)土性ノ如何ニ關セス苗代及苗代地接近ノ場所(四)花崗石ノ崩壞ヨリ成ル砂質壞土及ヒ砂土ニシテ低土ノ固結シタル處(五)礫ヲ混シタル粘土地(六)山間ノ埴土地等ナルカ如シ而メ本縣中右第一及第三ニ屬スヘキ處ハ各郡共ニ多少其局部ヲ存セサルモノナシ第二ニ屬スヘキ處ハ和氣、邑久、上道郡ノ或ル局部ニ之ヲ見ル第四ニ屬スヘキ處ハ御野郡ノ一局部津高郡ノ中央以南赤阪郡ノ東部南半邑久郡ノ西部上道、兒島、都宇、窪屋、淺口、小田、後月、賀陽、上房、阿賀、眞島郡ノ局部之レナリ第五ニ屬スヘキ土地ハ津高、赤阪、磐梨、ノ局部和氣郡ノ中央東南部邑久郡ノ北部等之レナリ第六ニ屬スヘキ土地ハ兩備作三國中ノ山間ニ於テ點々此病

ニ罹リタル處ヲ見タルコアリ

萎縮病試驗地

本年ハ明治二十六年ト同シク萎縮病試驗地ヲ上道郡金田村大字金岡新田ニ相シ同村串田久治ヲ以テ試驗管理人ト定メタリ同人ハ農業篤志者ニシテ昨二十七年ハ地方費ヲ以テ行フヘキ該試驗ヲ他ニ移サレタルニ依リ自費ヲ以テ同試驗ヲ行ヒタリト云フ故ニ本年ノ如キハ少シモ損益ノ事ニ心ヲ置カス非常ノ熱心ヲ以テ此試驗ニ從事シタリ抑本試驗地ハ第一圖ニ示シタル丙ニ限リ二十六年ニ萎縮試驗ヲ行ヒタレヒモ同圖甲乙ハ本年初メテ之ヲ行フモノナルカ故ニ試驗ノ順序トシテ土壤ノ如何ヲ知ランカ爲メ土塊ヲ採集シ之ヲ農事試驗場廣島支場ニ送リ定量分析ヲ依賴シタルニ左ノ成蹟表ヲ得タリ

%	窒素	可溶珪酸	酸化銕	亞酸化銕	石灰	苦土	加里	曹達	燐酸
甲	〇、一〇八	八、六七三	一、五〇八	一、九八五	〇、四二五	〇、八七五	〇、一八五	〇、〇五五	〇、〇七九
乙	〇、一三六	九、六一二	二、二七二	二、九一七	〇、三五六	〇、八〇七	〇、一九九	〇、〇五六	〇、〇六三

萎縮病試驗ノ區別

本年ノ萎縮病試驗ハ左ノ三大區ニ別ヶ行ヒタリ

(天)萎縮病增殖試驗　增殖ト云フト雖未タ其原因明ラカナラス故ニ斯クスレハ增殖スヘシト信シタル方法ヲ以テ此名稱ヲ付シタリ

(地)萎縮病豫防試驗　是レモ亦斯クスレハ豫防シ得ラルヘシト信シタル方法ヲ云フ

(人)舊慣試驗　試驗地上道郡金田村內ニ於テ從來行フ處ノ方法ヲ云フ

(天)萎縮病增殖試驗ハ第一圖ニ示セルカ如ク左ノ九種十二區ニ別ツ

(甲)紫雲英區　紫雲英區ト云フト雖燒酎粕ヲ併用ス

(乙)生藁區　生藁區ト云フト雖燒酎粕ヲ併用ス

(丙)雄町稻區　燒酎粕ヲ單用ス

(丁)神力稻區　仝上

(戊)多肥料區　油粕、燒酎粕及ヒ木灰ヲ併用ス

(己)青草區　青草區ト云フト雖燒酎粕ヲ併用ス

(庚)鍊劑紫雲區　鍊劑紫雲英ノ外カ燒酎粕ヲ施シタリ

(辛)鍊劑生藁區　鍊劑生藁ノ外カ燒酎粕ヲ施シタリ

(壬)[1]深植區　燒酎粕ヲ單用ス

(壬)[2]仝　上　仝　上

(壬)[3]仝　上　仝　上
(壬)[4]仝　上　仝　上

此増殖試驗ハ深植區ノ(壬)[2]　(壬)[3]　(壬)[4]ヲ除ク外カハ從來萎縮病ヲ發生シタルコトナキ乾燥地ニシテ蔓薹作ノ跡ナリ肥料ハ甲　(乙　庚　辛　已)ノ五區ニ限リ煮沸(煮沸シタルハ蟲類及ヒ其卵ヲ殺ス爲メナリ)シタルモノヲ小切シ其他ハ粉末トシテ挿秧前之ヲ用ヒタリ而メ各區ノ施肥分量一反歩當リ左ノ如シ

(甲)乾燥紫雲英六十貫目、燒酎粕九貫目
(乙)乾燥蕎六十貫目、燒酎粕九貫目
(丙)燒酎粕九貫目
(丁)仝　上
(戊)油粕三十貫目、燒酎粕九貫目、木灰二十貫目

(己)畦畔ノ生雑草二百貫目、燒酎粕九貫目
(庚)(銕分ノ外カハ甲ニ同シ)
(辛)(銕分ノ外カハ乙ニ同シ)
(壬)[1]燒酎粕九貫目
(壬)[2]仝　上
(壬)[3]仝　上
(壬)[4]仝　上

此増殖試驗ノ苗ハ四月七日籾ヲ浸水シ五月二日青草ヲ耕入シタル苗代一坪ニ三升ノ割合ヲ以テ播付シ二回水肥ヲ施シタルモノヲ用ヒ六月二十二日ニ挿秧シタリ其後ハ水ヲ深クシ開花結實ノ頃ニ至ルマテ一回モ排水セス務メテ空氣ノ土中ニ透入セサル樣ニナシ酸化作用ヲ妨ケタリ其成蹟ハ一覽表ニ示スカ如

シ

(地)萎縮病豫防試驗ハ第一圖ニ示セルカ如ク左ノ三種四區ニ別ツ

(甲)紫雲英早刈耕入區　花盛リノ紫雲英ヲ刈リ取リ小切シ耕入ス

(乙)腐熟紫雲英廐肥區　花盛リノ紫雲英ヲ刈リ取リ廐肥ト混シテ堆積腐熟セシメテ用ヒタリ

(丙)淺植區ノ一　苗ノ倒レサルヲ度トシ成ルヘク淺ク植ヘタリ

(丁)淺植區ノ二　仝上

此豫防試驗ハ(天)試驗ノ壬ト共ニ從來頻リニ萎縮病ヲ發生シタル砂土地ニシテ[2]

(甲)(乙)ノ紫雲英ニ限リ學者ノ唱ヘテ以テ最モ利益アリト

稱スル花時ニ刈リ取リ甲ハ小切シテ挿秧ヨリ三十日前ニ耕入シ乙廐肥ト相混

シ堆積シテ腐熟セシメ挿秧ヨリ二日前ニ耕入シ二者共ニ有機酸炭酸瓦斯ノ發

生及土壌組成分中ノ酸素ヲ奪フコノ少ナカランコトヲ期シ(丙)(丁)ノ二區ハ燒酎粕ヲ粉碎シ代掻前ニ散布シタリ而メ各區ノ施肥分量一反歩當リ左ノ如シ

(甲)生紫雲英貳百貫目、燒酎粕八貫目

(乙)生紫雲英百貫目、廐肥百五十貫目、燒酎粕八貫目

(丙)廐肥百五十貫目、燒酎粕九貫目

(丁)仝　上

此豫防試驗ノ苗ハ四月十二日籾ヲ浸水シ四月十八日苗代一坪七合ノ割合ヲ以テ播付シ二回水肥ヲ施シタルモノヲ用ヒ六月二十日ニ挿秧シタリ其後ハ水ヲ淺クシ開花結實マデ二數回排水シ務メテ空氣ヲ土中ニ透通セシメ酸化作用ヲ補ハントセシモ土用ノ終リニ至ルマデ雨天ノ日多クシテ爲メニ意ノ如ク乾田シ得サリシト雖其後ハ乾排共ニ宜シキヲ得一覽表ニ示スカ如キ成蹟ヲ得タリ

(八)舊慣試驗ハ第一圖ニ示セルカ如ク左ノ二區ニ別ツ

第一舊慣區　試驗所在地近傍ニ於テ行フ栽培法ニ據ル故ニ舊慣ノ名ヲ付シタリ而メ第一ハ蓁蓙作ノ跡ナリ

第二舊慣區　第一舊慣區ト並地ニシテ半ハ蓁蓙作ノ跡半ハ麥作ノ跡ナリ此舊慣試驗ハ萎縮增殖試驗及豫防試驗ノ成蹟如何ヲ知ラント欲シ比較標準ノ爲メ設ケタルモノニシテ從來萎縮病ヲ生シタルコトモ試驗地ノ中間ニ位スル土地ニ行ヒタリ肥料ハ試驗地所在ノ農家一般ニ用ユル廐肥及燒酎粕ヲ施シタリ其分量ハ(地試驗ノ丙丁ニ同シ)

此舊慣試驗ノ苗ハ四月二十七日籾ヲ浸水シ五月二日苗代一坪ニ一升ノ割合ヲ以テ播付シ二回水肥ヲ施シタルモノヲ用ヒ六月十九日及二十日ノ兩日ニ挿秧シタリ其後ハ水ノ深淺及灌漑ハ一ニ地方ノ習慣ニ據リ取捨シタルコトナシ其成

蹟ハ一覽表ニ示スカ如シ

萎縮病比較試驗

此試驗ハ籾蒔ノ原簿及早中晩カ如何ニ該病ニ關係アルカヲ知ランカ爲メ第一圖ニ示セルカ如ク左ノ六區ニ別ケ試驗シタリ

(イ)早蒔區　(ロ)中蒔區　(ハ)晩蒔區

(ニ)三升蒔區　(ホ)二升蒔區　(ヘ)七合蒔區

此比較試驗ハ前項人試驗地ト同一地區ニシテ肥料ノ如キモ試驗地所在ノ農家ガ一般ニ行フ如ク挿秧前ニ當リテ一反歩ニ付燒酎粕七貫目廐肥百五十貫目ノ割合ヲ以テ耕入シ二番除草ニ際シテ同シク一反歩ニ付五貫目ノ鯡搾粕ヲ施シタリ苗ハ(イ)區ニアリテハ四月十二日籾ヲ浸水シ苗代一坪一升ノ割合ヲ以テ同月十八日播付シ二回水肥ヲ施シタルモノヲ用ヒ六月十九日ニ挿秧シタリ(ロ)區

ニアリテハ四月十五日籾ヲ浸水シ同月二十二日（イト同量ニ播付シ施肥挿秧モ亦同一ナリハニホヘノ各區ニ在リテハ四月二十七日籾ヲ浸水シニハ坪三升（ホハ坪二升ヘハ坪七合ノ割合ヲ以テ五月二日播付シイト同樣ノ肥料ヲ施シ同日ニ挿秧シタリ其後ハ水ノ深淺及灌排ハ共ニ人試驗ト毫モ異ル處ナク二番除草ニ際シテ補肥ヲ一回施シタルコアルノミ其成績ハ一覽表ニ示スカ如シ

萎縮病苗代跡ノ試驗

此試驗ハ稻作本田ト苗代跡ハ該病ヲ生スルコ何レニ多少アルカヲ見ント欲シテ行フ處ナリ而メ其試驗ハ第一圖ニ示セルカ如ク左ノ三區ニ別ツ

（一）無肥料區　本區ハ苗ノ吸收シ殘シタル肥料ニテ生育セシメンカ爲メ苗拔取後耕起挿秧シテ肥料ヲ施サス

（二）人糞尿區　本區ハ苗拔取後耕起シ人糞尿ト水ト混シタル水肥ヲ施シ然

ル後挿秧シタリ

(三)棉實區　本區ハ苗拔取後耕起シ煮タル棉實ヲ蹈ミ込ミ水ヲ排出シ空氣ヲ土中ニ疏通シ九日間晩レテ挿秧シタリ

此苗代跡ノ試驗ハ前ノ(人)試驗地ト同一地區ニシテ前記ノ如ク普通ノ水田ト如何ニ該病ヲ生スル多少アルカヲ見併セテ世人ノ所謂苗代跡ハ他ノ水田ヨリ數日間晩レテ挿秧スレハ萎縮病ヲ生セストノ言ヲ確カメンカ爲メ特ニ九日間晩植シタリ苗ハ前項比較試驗ニ用ヒタルモノト同一ナリ其成蹟ハ一覽表ニ示スカ如シ

挿秧後各試驗區ノ景況

挿秧後各試驗區ノ稻生育及萎縮病ノ有無ニ關シ其概況ヲ記スルヿ左ノ如シ

一番除草(七月二日雁爪打ヲ行ヒタリ)ノ時ハ豫防試驗ノ(乙)區苗代跡試驗ノ(二)

區ハ既ニ綠色ヲ呈シ分蘗ヲ初メタレドモ其他ハ增殖試驗各區ノ黃色ニ比スレハ何レモ皆稍ヤ綠色ヲ現ハシタルノ感アリタルニ過キスシテ未タ萎縮病ノ兆ヲ見サリシ

二番除草（七月十一日ニ行ヒタリ）ノ時ハ豫防試驗ノ甲乙區苗代跡試驗ノ二區ハ共ニ綠色他ヨリモ濃クシテ分蘗モ亦最モ盛ンナリ其他ハ增殖試驗各區ヲ除ク外カハ皆綠色ヲ呈シ分蘗ヲ初メタレドモ增殖試驗各區ハ共ニ近傍ノ稻ニ比シテ分蘗少ク淡綠色ニメ生育大ニ晩レタリ當時萎縮病ノ兆ヲ發シタル稻ハ增殖試驗區中ノ深植各區及青草區鋏劑二區ニ多ク殊ニ此數區中ニハ全萎縮ニ罹リタルモノアリシ之ニ次テ萎縮病ノ兆ヲ顯ハシタルハ同試驗中ノ生藁區紫雲英區多肥料區比較試驗中ノ晩蒔苗區早蒔苗區苗代跡試驗ノ無肥料區棉實區及第二舊慣區ニシテ其他ハ萎縮病ノ兆ヲ見ルヿ甚タ稀レナリシ

三番除草（七月廿三日ニ行ヒタリ）ノ時ハ増殖試験中ノ多肥料區豫防試験中ノ紫雲英早刈耕入區腐熟紫雲英廐肥區第一舊慣區ハ生育最モ盛ンニシテ之ニ次クモノヲ豫防試験ノ淺植區比較試験ノ三升蒔苗區及七合蒔苗區トス其他ニ至リテハ生育悪シク殊ニ苗代跡試験ノ無肥料區ハ既ニ黄色ヲ呈シタリ萎縮病ニ至リテハ二番除草ノ時ト別ニ増減ナキモノト認メタリ故ニ四番除草及五番除草ノ生育及萎縮病ノ景況ハ之ヲ省畧ス

深植區ノ事

萎縮病ニ就テ最モ不審ナルハ京都府産ノ萎縮不知ト稱スル稻之レナリ此稻ハ何レノ試驗場ニ於テモ萎縮ヲ生シタルコトナシ其何故ナルカヲ確メンカ爲メ種々調査セル折柄明治廿七年秋圖ラズ該稻カ根取リノ淺キコトヲ發見シタリ是ニ於テ思フニ萎縮病ノ主因ハ其何タルニ關セズ殊更ニ苗ヲ深植セハ或ハ萎縮病

ノ發生多カルヘシト依テ本年ノ各試驗中增殖試驗ヲ行フタル地所ニモ之ヲ置キ（土壤分析表甲參照）豫防試驗ヲ行フタル地所モ之ヲ置キ（土壤分析乙參照）舊慣試驗ヲ行フタル土地ニモ之ヲ設ケタリシニ果セルカナ各區通シテ萎縮病ヲ發生スルヿ甚タ多カリシ故ニ特記シテ後回試驗ノ參考ニ供ス

摘要

本年施行シタル各試驗ノ成蹟ニ據リ其要ヲ摘記スレハ左ノ如シ

一、籾ハ薄ク蒔キタルモノヨリ厚ク蒔タルモノ被害少シ

二、籾ヲ蒔ク期節ハ晩キモノヨリ早キモノ被害少シ

三、挿秧ノ早晩十日以內ニテハ別ニ關係ナキカ如シ

四、挿秧及灌水ハ深キニ從ヒ生育惡シク且ツ淺キモノヨリ被害多シ

五、苗代跡ハ數日間晩レテ植ユレハ被害少シトノ說ハ未タ信ヲ措キ難シ

六、肥料ハ新鮮ノモノヲ施スヨリモ腐熟シタルモノヲ施ス方被害少シ

七、苗代跡試驗ノ無肥料區ニ萎縮ノ多キコト及二番除草迄ニ萎縮ノ徵ヲ發シ其後萎縮ノ增減セサルヲ以テ見レハ萎縮ノ生スル原因ハ或ハ苗代地ノ狀態ニ關係スルコト多クシテ本田ニハ關係少キカ如シ

八、稻ノ種類ハ其何タルヲ問ハス太莖ノモノハ細莖ノモノヨリ萎縮ニ罹ルコト多キカ如シ

原因ニ關スル諸說及ヒ附屬試驗

萎縮病ノ原因ニ就テ記者カ最モ早ク聞キタルハ稻株土中ノ部ニ於テ數々見所ノ白キ小虫カ（小野孫三郎氏ノ說ニ據レハ此虫ハ金龜子幼虫ニシテ萎縮ノ原因ニアラストト云フ）稻ノ白根ヲ喰害スルトノ說之レナリ次ニ聞キ得タルハ地中ニ含有スル亞酸化銕、硫化銕及ヒ此等ノ酸化銕ノ還元ヨリ起ルトノ說之ナ

ナリ其次キニ聞キ得タルハ黴菌ノ寄生ナラントノ說之ナリ近來又何レノ苗代ニモ能ク發生スル所ノよこむひト稱スル小虫カ葉芽ノ養液ヲ吸收スルニ因ルトノ說之レナリ依テ左ノ試驗ヲ行ヒタリ

第一、苗ノ根ヲ悉ク切リ去リテ挿秧シタリ

第二、苗ノ新芽新葉ヲ摘ミ去リテ挿秧シタリ

第三、表土三寸低土五寸ノ見込ヲ以テ木製ノ桶ニ深サ八寸ノ土ヲ入レ酸化銕及ヒ硫酸銕ノ分量ヲ異ニシ各五個ニ施シヲ挿秧タリ

此試驗ハ萎縮病增殖試驗ト同樣ノ苗ヲ用ヒ大小長短ヲ撰別シ一株五本植トシ肥料ハ青草、乾草、生藁ニ各鯡搾粕ヲ混用シタリ而メ挿秧後ハ總テ盛ンニ生育シ酸化銕ヲ施シタル試驗一桶ノ數莖螟虫ニ罹リタルモノ、外カハ皆異狀ヲ呈セス刈取マテ遂ニ萎縮ノ兆ヲ發シタルモノナシ

終リニ一言ス右附属試驗中第一及第二ノ試驗ハ擔任者カ本縣廳ニ職ヲ奉シタル以前ニ於テ二回之ヲ行ヒタルモノニシテ本試驗ヲ合シテ三回ニ及フモ未タ一回モ萎縮病ヲ發シタルコトナク第三ハ本年ノ考案ニシテ完全ノモノニハアラス殊ニ此等ノ試驗ハ人爲ノ方法ニシテ其何ノ害タルニ關セス自然ニ起ル所ノ狀態ト其軌ヲ異ニスルハ勿論ニシテ少クトモ五七回ノ試驗ヲ重ヌルニアラサレハ容易ニ其原因ヲ斷定スルコト難シ故ニ後回ノ試驗ヲ以テ之ヲ確カメントス

第一圖

甲

紫雲英區
生藁區
雄町區
神力區
多肥料區
青草區
錬劑紫雲英區
錬劑生藁區
深植區ノ一

乙

淺植區ノ一
腐熟紫雲英廐肥區
紫雲英早刈耕入區
深植區ノ二
淺植區ノ二

丙

早蒔苗區
中蒔苗區
晩蒔苗區
深植區ノ三
第二舊慣區
三升蒔苗區
二升蒔苗區
七合蒔苗區
深植區ノ四
第二舊慣區
無肥耕區
人糞區
棉實區

稻萎縮病試驗成蹟一覽表

	半萎縮株數	全萎縮株數	萎縮總數	米收量
增殖試驗				
紫雲英區	七三	—	七三	二二
生藁區	八四	—	八四	二二
雄町區	九七	二	九九	二二
神力區	四八	—	四八	二二
多肥料區	一〇五	三	一三八	二二
青草區	一三八	—	一三八	二二
銕劑紫雲英區	一四二	九	一五一	二二
銕劑生藁區	一四〇	七	一四七	二二
深植區ノ一	九九	一	一〇〇	二二
仝上ノ二	一二一	一	一二二	二二
仝上ノ三	一八七	一	一九八	二二
仝上ノ四	一七四	二	一七六	二二
豫防試驗				
紫雲英早刈耕入區	四二	—	四二	二八
腐熟紫雲英廐肥區	四〇	—	四〇	二七
淺植區ノ一	三三	—	三三	二六
仝上ノ二	四二	—	四二	二七
舊慣試驗				
第一舊慣區	五一	—	五一	二六
第二舊慣區	五四	一	五五	二三
比較試驗				
早蒔苗區	八〇	三	八三	二一
中蒔苗區	七九	二	八一	二一
晩蒔苗區	一一三	一	一一四	二六
三升蒔苗區	五〇	—	五〇	二七
二升蒔苗區	八三	二	八五	二六
七合蒔苗區	六七	二	六九	二六
苗代跡試驗				
無肥料區	一二六	六	一二六	一八四
人糞區	七八	—	七八	一九〇
棉實區	一〇八	—	一一四	一九九

右各試驗總反別ハ五反歩ニシテ苗代跡ヲ除ク外カハ一區劃ヲ壹畝歩ニ改算シタリメ壹畝歩乃至五畝歩トナシタレ𪜈萎縮ノ多少ヲ見易カラシメンガ爲

明治廿九年十月廿三日印刷
明治廿九年十月廿六日發行

岡山縣內務部第五課

岡山縣岡山市下出石町一番邸
印刷者　大久保均五郎

岡山縣岡山市下出石町二番邸
印刷所　大久保活版所