整理番号

AⅢ－２　　3465

標題名

日本植物調査報知　第２集

著者名

牧野富太郎

製作年月

2012年3月

牧野富太郎著

自第十二回
至第廿二回

日本植物調査報知

第二集

明治卅三年
二月再刊

東京 合資會社 敬業社發兌

寄贈図書
東大・植物病理

牧野富太郎著

自第十二回
至第廿二回

日本植物調査報知

第二集

植物研究雜誌館
図書之印

明治卅三年
二月再刊

東京 合資會社 敬業社發兌



CONTRIBUTIONS

TO THE STUDY OF

THE FLORA OF JAPAN.

XII-XXII. 1899.

By

T. Makino,

Assistant of Botany in the Science College,
Imperial University, Tokyo.

Reprinted from the Botanical Magazine, Tokyo, 1899.

TOKYO:

KEIGYŌSHA & Co.

1, Urazimbōchō, Kanda.

1900.




宇城居士

日本植物調査報知第二集序

匆忙ノ間歳空シク此ニ暮レ囘ヲ重ヌル十一財ニ本書ノ第二集ヲ成ス」　嗚呼此片々タル小册子其收錄スル所果シテ幾何ゾ一春秋ノ間得ル所ノ事止ニ是レノミニ非ラズト雖モ而モ蓄積殊ニ尠ク其斯學ニ貢獻スル誠ニ見ルニ足ラザルヲ愧ヅ謂フ可シ素志ニ負ク大ナリト」　是ニ於テ乎序ス」

明治三十二年歳除

結綱學人　牧野富太郎　識



日本植物調査報知　第二集

牧野富太郎著

Contributions to the Study of the Flora of Japan. II.

By Tomitarô Makino.

○第十二回（明治三十二年一月二十日刊行植物學雜誌第十三卷第百四十三號）

○五十四 本邦いかりさう屬ノ諸種

本邦ノいかりさう屬即チ Epimedium ハ左ノ諸種ヨリ成ル是レ今日予ノ知リ得タル全數ニ屬ス就中其ほゞきいかりさうハ江州ニ自生アリ（本草綱目啓蒙）ト稱スト雖ヒ蓋シ本ト漢種ヲ傳ヘシ者ナリ而シテひめいかりさうノ傳モ亦茫乎トシテ知ル所ナシ

1. Epimedium macranthum Morr. et Decne.

（和名）いかりさう

是レ草木圖說卷之二ニ圖說セル品種ニシテ今同書用ウル所ノいかりさうノ名ヲ採テ之レニ定ム而シテ本草圖譜ニ在テハ其卷之六第十一葉裏ノ「一種いかりさう」ト記シテ圖說セル者即チ此種ニ屬ス

伊藤篤太郎氏著 Berberidearum japonicæ conspectus. ニ本草圖譜卷之六第十一葉表左方ノ一品（白花品）ヲ以テ本種ニ充テアルハ穩當ナラズ是レ即チ次條ノ品種ニ屬ス

2. Epimedium macranthum Morr. et Decne. var. violaceum Franch. = *Epimedium violaceum* Morr. et Decne.

(和名)くもきりさう(?)

草木圖說ニハ此品ノ圖ナシ而シテ本草圖譜ニ之レアリ即チ同書卷之六第十葉裏幷ニ第十一葉表ニ亘ルノ四品皆之レニ屬ス其右端ノ品ハ蓋シ即チ之レガ摸表者ニシテ紫花ヲ發ラク灌園氏ハ之レヲいかりさうト記セリ而シテ其次ノ者ハ淡紫花品ニ屬シ又其次ノ二品ハ共ニ白花ノ品ニ係ル此ノ如ク花色ニ種々アリト雖モ皆ナ Var. violaceum. ニ屬スルナリ "violaceum" ノ名ニ拘ハリテ之レヲ紫花品ノミニ限ルガ如ク思フハ是ニアラズ而シテ此等ノ諸品其花瓣ノ距ハ皆萼片ヨリ差〻短ク或ハ微ニ長シ以テ前種ノ長距者ヨリ相分ツ可シ

伊藤氏同上ノ論文中此種ノ下ニ本草圖譜卷之六第十一葉裏ノ一圖ヲ引用スルハ非ナリ是レ正ニ上ノ Epimedium macranthum *Morr. et Deene.* ノ正品ナリ又圖譜第十葉裏ノ圖ヲ引用シテ而シテ(?)ヲ加ヘアレモ此ノ如キ疑點ヲ其間ニ挿ムノ必用ナシ是レ其圖ハ正シク其品ニ屬スレバナリ今其引用ノ跡ニ就テ之レヲ察スルニ蓋シ同氏ハ唯ダ其花色ノミニ拘泥セラレシト見ユ

又同氏更ニ其論文中ニ Epimedium macranthum γ.? humile *T. Ito.* ノ名ヲ新設シ本草圖譜卷之六第十一葉表右方ノ一圖ヲ以テ之レニ充ツ然モ是レ只 Var. violaceum. ノ一品 (forma) ノミ予ハ殊ニ E. macranthum. 中ノ一變種トシテ之レヲ擁立スルノ必要ヲ見出スルニ苦シム

3. Epimedium alpinum Linn. var. rubrum Hook. f. = *E. rubrum* Morr.

(和名)ひめいかりさう(新稱)

予ハ先ニ之レヲ東京ノ一花戸ニ得タリ而シテ花體小ナリ此品曾テ本邦ヨリ歐洲ニ輸入シ 1844 年 *Ch. Morren* 氏始メテ命名記述セリ本邦ノ自生地未ダ詳ナラズ

草木圖說卷之二ばいくゎいかりノ條下「又草狀相似テ一枝ニ三葉ヲツケ花形略同メ淡紅色ナルアリ別ニ一種ニ

メ本條ノ花色異ナルモノニアラズ」ト言フ者蓋シ或ハ此種ヲ指スカ

4. Epimedium diphyllum Lodd. = *Epimedium japonicum* Sieb. = *Aceranthus diphyllus* Morr. et Decne.

(和名)ばいくゎいかり

四國幷ニ九州ニ自生シ花小ニシテ其色白シ

5. Epimedium sinense Sieb. = *Epimedium Ikariso* Sieb. = *Aceranthus sagittatum* Sieb. et Zucc. = *Epimedium sagittatum* Maxim. = *Epimedium Musschianum* Morr. et Decne. non Bot. Mag. t. 3745.

(和名)ほざきいかりさう

上ニ既ニ記スルガ如ク本品未ダ内地ニ自生セルアルヲ見ズ或江州ニ自生アルヲ言フ是レ甚ダ怪ム可シ

○五十五 こほろぎらんノ記

こほろぎらんハ蕚爾タル一蘭品ナリ而シテ一ノ稀品ニ屬ス明治廿二年九月四日創テ之レヲ土佐國高岡郡横倉山ニ發見ス其詳圖載セテ拙著日本植物志圖篇第七集ニ在リ予始テ之レヲ得ルヤ之レヲ露國ノ *Maximowicz* 氏ニ送ル同氏乃チ研考シ直ニ命名シテ Stigmatodactylus sikokianus *Maxim.* ト云フ即チ新屬ノ品種ニ係ルナリ 1890 年二月二十二日露都聖彼都斯堡發同氏書信ノ一節ニ曰ク "The *Orchid* is quite a new genus of the tribe of *Neottieae*, subtribe *Diurideae*, and allied to the Tasmanian *Burnettia* and the Australian *Clossodia*. Your analysis is excellent. I dissected a flower bud myself and found everything just as figured by you. I have called the plant, on account of the remarkable fingerlike appendage under the stigma, *Stigmatodactylus Sikokianus*." ト以テ其天籍ヲ察スルニ足ル可シ而シテ同氏未ダ其記文ヲ公ニスルニ及バズシテ物故ス予今此ニ姑ク邦文ヲ以テ之レヲ著ハシ以テ其缺漏ヲ補フト云フ

Stigmatodactylus Sikokianus Maxim. in litt. 1890.

Icon. *Makino* Illustr. Fl. Jap. I. n. 7, tab. XLIII

Nom. Jap. *Korogi-ran* (T. Makino.) こはろぎらん

全草長サ三乃至十「センチメートル」許、地下茎ハ塊狀、毬形或ハ楕圓形、小形、大ナル者其徑三「ミリメートル」許、單一、多肉、之ヨリ細小ナル長茎ヲ生ジ以テ地上茎ニ連ル上部ニ二三ノ鱗苞葉アリ無色ニシテ下部ノ一二者ヨリ其腋ニ各一ノ枝芽ヲ生ズ枝芽ハヤヽ多肉、茎體ハ總テ白色、毛根ヲ蒙リ柔軟ナリ、茎ハ單一、細小、有稜、淡綠、中部ノ上方ニ一葉ヲ着ク、葉ハ綠色、無花者ノ葉ハ下部ノ者ハ鱗狀ヲ成シ上部ノ者ハ柄ヲ有シ柄ハ鞘ヲ成シ葉面ハ略〻圓形ニシテ鋭頭ヲ有ス、花蓋ハ開展シ薄質、外花蓋片ハ線形、全邊、鋭頭、單脈、分生、ヤヽ前方ニ彎曲ス、上者ハ四「ミリメートル」長、側者ハ二半「ミリメートル」長、淡綠色ニシテ上者ハ中部以下ニ紫暈アリ側者ハ開花ノ時ニ在テハ牌片ノ下ニ隱レリ、而シテ共ニ基部ノ兩側ニ條毛ヲ有ス、內花蓋側生片ハ分生、全邊、鋭頭、單脈、基部ニ條毛ナシ、ヤヽ前曲、三半「ミリメートル」、淡綠色ニシテ下部ニ紫采アリ、牌片ハ藥柱ト殆ンド直角ヲナシテ出デ圓形ニシテ下部ヤヽ狹シ平坦薄質ニシテ全邊ナレ𪜈前緣ニハ微ニ嚙痕アリ四「ミリメートル」徑アリ極メテ淡紫色ニシテ中央ニ縱ニ濃紫采アリ副器其基部ヨリ前面ニ斗出シ一半「ミリメートル」長アリヤヽ多肉ニシテ基部ノ上方ハ藥柱ト連リ體ハ中央ヨリ上下ニ二裂シ上片ハ下片ヨリヤヽ短ク而シテ共ニ二岐シ紫色ナリ、藥柱ハ直立シ三半「ミリメートル」長、上部ハ前曲シ前面ノ中央ニ副器アリテ斗出ス副器ハ細小ニシテ二鈍齒ニ分レ藥柱ト共ニ淡綠色ナリ、柱ノ上部ハ略半柱狀ヲ成シ其兩側ハ稍〻翼狀ヲ呈シテ薄シ、葯床ハ三岐シ前彎ニハ嘴アリ尖端ハ鈍ナリ、葯蓋ハ二片ニシテ著シク葯床ノ後岐部ニ附連シ淡褐色ヲ呈シ面ハ細粒ヲ布ケリ花粉塊ハ四個ニシテ二個ヅヽ共ニ相並ビ略楕圓形ニシテ壓扁シ細小ナリ淡紫褐色ニシテヤヽ粘氣アル臘質ヲ成ス、柱頭ハ葯床ノ下ニ在リテ下緣ヨリハ長嘴

ヲ斗出シ嘴端ハ珠ヲ成セリ、子房ハ下生、約ソ五「ミリメートル」長、三稜ニシテ稜面ニハ各〻一ノ縱畝アリ圓柱狀長橢圓形ニシテ下方ハ狹ク柄狀ヲナシテ捩レズ、淡綠色、單胞、三胎座、胚珠ハ細小、白色、無數、未熟果實ハ頂ニ花蓋、蘂柱ノ宿存セル者ヲ戴キ圓柱狀長橢圓形、下部柄狀、三稜ニシテ稜面ニハ各〻一ノ縱畝アリ

多年生本ニシテ山地ノ樹下ニ生ジ、朽葉ノ堆中ヨリ出ヅ

上ノ記文尙悉サヾル處アリ即チ葉幷ニ花序ノ狀態等是レナリ此ノ如キハ其圖ニ就テ之レヲ驗スレバ則チ直ニ判明スベシト雖モ後日更ニ歐文ヲ以テ記スルノ時之レヲ補入スベキヲ期セリ

○第十三回（明治三十二年二月二十日刊行植物學雜誌第十三卷第百四十四號 同 年三月二十日刊行植物學雜誌第十三卷第百四十五號）

○五十六 日本產 Athyrium 屬ノ覆審

Athyrium ハいぬわらび屬ナリ而シテ往々之レヲ取テ以テ Asplenium 卽チとらのをしだ屬ノ亞屬ト爲ス者アリ而シテ之レニ屬スル本邦產品亦鮮シトナサズ予ハ頃日之レヲ覆審シ新タニ得ル所ノ事實多シ今左ニ其要項ヲ記シ以テ之レヲ同好ノ士ニ報ゼント欲ス而ノ其間ニ得タル新種ハ更ニ之レヲ我 Plantæ Japonenses novæ vel minus cognitæ. 中ニ詳記セリ

Athyrium crenatum Rupr. = *Asplenium crenatum* Fries. = *Asplenium sibiricum* Kunze.

（和名）みやましだ（新稱）

歐亞兩洲ノ北陬ニ產シ我邦ニ在テハ中部以北ノ深山ニ生ズ葉形三角狀ヲ成シ最末裂片ハ廣闊ナル鈍頭長橢圓形ヲ呈シ邊緣ニ僅少ナル粗鈍齒ヲ列ス根莖ハ橫走シ葉柄ハ散生シ鱗片ハ暗褐色ナリ明治廿一年七月之レヲ武州秩父八日見山ニ得タリ

Athyrium crenulatoserrulatum Makino (sp. nov.) = *Asplenium crenulatoserrulatum* Makino.

(和名)おほみやまいぬわらび(松村任三氏)

瞥見頗ル能ク前種ニ類似ス然モ葉形彼レガ如ク正三角ナラズシテ卵狀三角形ヲ成スコト常ナリ葉質柔薄ニシテ最末裂片ハ前種ヨリ小ニ而シテ邊緣ニ細微ナル鈍鋸齒ヲ列ス中軸幷ニ亞軸ノ上部下面ハ小羽片下面ノ中脈上ト共ニ細微ノ短毛ヲ布ク根莖ハ横走シ葉柄ハ散生シ鱗片ハ濃褐色ナリ本邦中部地方ノ深山ニ產ス

Athyrium Hookerianum Moore, 1857. = *Cystopteris spinulosa* Maxim. 1859. = *Asplenium spinulosum* Miq.

此種予未ダ之レヲ本邦ニ得ズ

Athyrium cystopteroides Eat. = *Asplenium cystopteroides* Hook.

日本南方ノ產ナリ予ハ未ダ之レガ標品ヲ見ズ

Athyrium thelypteroides Desv. = *Asplenium thelypteroides* Michx.

(和名)みやましけしだ

Athyrium viridifrons Makino = *Asplenium viridifrons* Makino.

(和名)みどりわらび

葉狀三角形或ハ卵狀三角形ヲ成シ羽片ノ軸ニ狹翼アリ最末裂片ハ長楕圓形鈍頭ニシテ邊緣鈍齒ヲ列ス葉質薄クシテ乾キテ後尙綠色ヲ保ツ囊堆ハ細小ニシテ往々馬蹄鐵狀ヲ呈ス根莖ハ横臥シ肥厚ナル葉柄本ノ宿存セル者ヲ有ス而シテ鱗片ハ茶褐色ナリ土佐國横倉山ニ產ス予ハ未ダ之レヲ他處ニ得ズ

Athyrium Okuboanum Makino. = *Aspidium Okuboanum* Makino = *Asplenium Okuboanum* Makino.

(和名)おほひめわらび

根莖横臥シテ宿存セル肥厚ノ葉柄本ヲ有シ鱗片ハ茶褐色ナリ葉柄ハ長ク葉面ハ長卵形ヲ呈シテ大ナリ羽片ノ軸ニ狹翼ヲ有スルコト前種ノ如ク小羽片ハ披針形ニシテ邊緣一般ニ卵狀廣楕圓形ノ小片ニ分ル囊堆多數ニシテ圓キ馬蹄鐵形ヲ成ス予始メ其圓形ナルニ見テ之レヲ Aspidium 屬ノ一種ナリト誤認セシコトアリ而シテ其未ダ充分發達セザル葉ニ在テハ小羽片鈍頭長楕圓形ヲ成シテ邊緣ニ鈍齒ヲ列シ其形相頗ル老成ノ葉ニ異ナリ其狀恰モ Gymnogramme decurrenti-alata *Hook.* 卽チしけちしだニ見ル所ノ如シ而シテ其形狀亦兩種此ニ相似タルハ稍奇ト稱ス可キナリ

Athyrium pteroracbis Christ.

(和名)おほめしだ(新稱)

予ハ我 Herbarium 中ニ明治廿一年九月越後上野兩國界ノ清水峠ニ於テ自ラ採集シタル一標品ヲ藏ス大久保三郎氏ハ日光山ニ得ラレタルヲ語レリ大形草質ノ一羊齒ニシテ羽片開出シ多數ノ小羽片其兩側ニ整列シテ略櫛齒ノ狀ヲ成ス羽片ノ中軸翼ヲ有スルコト宛モげじげじしだノ如ク而シテ囊堆ハ多ク其頭部鉤狀ニ曲ル葉柄肥厚ニシテ鱗片大ニ且其色茶褐ヲ呈ス蓋シ本邦產 Athyrium 屬中ノ最モ雅麗ナル者ナリ

Athyrium macrocarpum (Bl.) = *Asplenium macrocarpum Bl.*

(和名)やまいぬわらび(予)　おほいぬわらび(予)(同名アリ)

予先キニ箱根產ノ一羊齒ヲ取テ之レヲ Asplenium nigripes *Bl.* トナセシハ *Maximowicz* 氏ノ鑑定ニ從ヒシナリ而シテ之レヲやまいぬわらびト呼ビタリ其後ニ至テ予ハ之レヲ Athyrium macrocarpum *Fée* (= *Asplenium macrocarpum* Bl.) ニ改メ又之レガ一類似品(東京近郊其他ニ產ス)ヲ取テ之レヲ Asplenium nigripes *Mett.* 卽チ Athyrium nigripes *Moore.* ニ配シ之レヲおほいぬわらびト稱シ共ニ之レヲ明治廿九年三月發刊ノ植物學雜

誌第百九號中絲條書屋植物雜記中ニ掲出シタリ而シテ今日更ニ精檢ノ結果ハ此兩品共ニ悉ク Athyrium macrocarpum (*Bl.*) ニ屬シテ而シテ其 Athyrium nigripes *Moore.* ハ全ク別ニ之レアルコトヲ發見シタリ故ニ予ハ此ニ先キノ兩和名ヲ取テ以テ之レヲシテ一ノ品種ニ隷屬セシメタリ

Athyrium nigripes Moore = *Aspidium nigripes* Bl. = *Asplenium nigripes* Mett.

(和名)こやまいぬわらび(新稱)

前種ニ類似ス然ㄈ其小羽片ハ通常之レヨリ小ニシテ且ツ鈍頭ヲ成ス而シテ其囊堆ハ鉤狀ヲ成サヾルヲ常トシ只其小羽片下部ノ者往々其形相ヲ呈スルノミナリ本邦ニ在テハ極メテ稀少ノ品種ニ屬ス

Athyrium Goeringianum Moore = *Aspidium Goeringianum* Kunze = *Asplenium Goeringianum* Mett.

(和名)ほそばいぬわらび

無性葉ハ小ニ有性葉ハ長大ナリ而シテ小羽片細裂ス蓋シ A. macrocarpum (*Bl.*) 近縁ノ一品種ナリ

Athyrium nipponicum (Mett.) = *Asplenium nipponicum* Mett.

(和名)いぬわらび

是レ我邦ニ在テ Athyrium 屬ノ Type ニシテ隨在多ク之レヲ生ズ其葉再羽裂ノ者ヲ通常トスレㄈ亦三羽裂ヲ成スヲ見ル *Franchet* 氏三變種ニ別ツ中ニ *Miquel* 氏ノ Aspleuium uropteron *Miq.* ヲ含メリ而シテ此三變種皆種中ノ各品ヲ含ムヤ否ヤ

Athyrium rigescens Makino. = *Asplenium rigescens* Makino.

(和名)たにいぬわらび

予明治二十九年三月發行植物學雜誌中絲條書屋植物雜記ニ於テ之レヲ Athyrium oxyphyllum *Moore* (= *Asplenium*

oxyphyllum Hook.) ニ充ツ然モ更ニ精査シ以テ其然ルベカラズシテ而シテ一新種ニ屬セルヲ知レリ其囊堆ノ狀頗ル A. nigripes *Moore.* ニ類ス而シテ小羽片ハ更ニ之ヨリ鋭ナリ葉質硬クシテ羽片ノ中軸常ニ紫色ヲ帶ブ

Athyrium Wardii Makino = *Asplenium Wardii* Hook.

(和名)ひろはのいぬわらび

從來本品ヲ取テ之レヲ Asplenium 屬中ノ Euasplenium 區ニ置ケリ然モ予ハ今之レニ左袒スルコト能ハズ而シテ其間理由ノ存スルアルヲ以テ斷然之レヲ Athyrium 屬ニ編入シテ疑ハズ

Athyrium Wardii Makino var. major Makino.

(和名)おほひろはのいぬわらび

Type ニ比スレバ更ニ大形ノ品種ナリ而シテ予ハ之レヲ別種トシテ分ツ能ハズ

Athyrium Filix-fœmina Roth var. nigropaleaceum Makino.

(和名)みやまめしだ

葉形歐產ノ Type 品ニ同ジ然モ其鱗片光澤アリテ且ツ暗黑ナリ

Athyrium Filix-fœmina Roth var. melanolepis Makino = *Asplenium melanolepis* Franch. et Sav.

(和名)めしだ　おほいぬわらび(松村任三氏)(同名アリ)

顯著ナル一變種ニシテ葉形歐產ノ者ヨリ更ニ闊大ナリ從テ其羽片小羽片モ亦之ヨリ大ナリ最末裂片ノ齒ハ鋭ナリ鱗片ハ黑褐色ナリ

Athyrium Filix-fœmina Roth var. deltoideum Makino.

(和名)さとめしだ(新稱)

葉形三角形ヲ成シ羽片ハ幅廣ク小羽片ハ深裂シ最末裂片ハ楕圓形ヲ成ス而シテ鱗片ハ茶褐色ナリ本品ハ恐クハ一ノ特立セル一種ナラント雖モ今姑ク A. Filix-foemina. ノ一變種ニ收ム

Athyrium yokoscence (Fr. et Sav.) = *Asplenium yokoscence* Fr. et Sav.

(和名)へびのねござ　こいぬわらび

葉質頗ル剛シ予ハ之レヲ A. Filix-fœmina *Roth.* ト同種ナリト考フル能ハズ其狀頗ル次條ノ品ト相似タリ次條ノ品予未ダ之レヲ見ズ故ニ此ニ其委曲ヲ述ベ難シ

Athyrium oxyphyllum Moore = *Asplenium oxyphyllum* Hook. = *Asplenium drepanopteron* A. Br.

「ヒマラヤ」山、「ヂャバ」島幷ニ日本ニ產スト云フ今其說文ヲ案ズルニ頗ル A. yokoscence. ト相似タリ然モ今此ニ其如何ヲ評記スルコト能ハズ

Mettenius 氏ハ A. drepanopteron *A. Br.* ヲ本品ト別ツ予ハ今 *Hooker* 氏ニ從フテ姑ク之レヲ同種ニ收ム本邦ニ產スト稱スル品ハ蓋シ此 Form ニ屬スルナリ

Athyrium microsorum Makino = *Asplenium microsorum* Makino.

(和名)てばこわらび

土佐吾川郡手筥山ニ產ス其質柔輭ナルト葉面ノ細裂スルトニ由テ著シ未ダ他處ニ得ズ

以上列記セル品種ハ蓋シ今日ニ知ラレタル本邦產 Athyrium 屬ノ全數ト言テ可ナリ而シテ我邦ハ頗ル本屬ノ品種ニ富ミタル一國ニ屬セリ

○五十七 さくらさう屬中四類品ノ再審

予先キニひなざくら即チ Primula nipponica *Yatabe.* ヲ以テ Primula cuneifolia *Ledeb.* ニ充テ以テ記スル所アリ是レ

即チ 1886 年幷ニ 1888 年出版ノ Bulletin de la société philomathique de Paris. 中ニ登載セル *M. Franchet* 氏ノ論文（宮部金吾氏ノ好意ニヨリテ之レヲ閲スルヲ得タリ）ニ憑據シテ之レヲ考定セシモノニ係レリ予ハ其後ニ至リテ *J. G. C. Lehmann* 氏著櫻草屬志（Monographia generis Primularum）ヲ得テ之レヲ繙クニ及ンデ Primula cuneifolia *Ledeb.* ト同種ニ收ムベキ所ノ Primula saxifragifolia *Lehm.* ノ圖說ヲ見ルヲ得始メテ Primula cuneifolia *Ledeb.* ヲ取テ之レヲ Primula nipponica *Yatabe.* ニ配スルノ穩當ナラザルヲ感ジタリ予ハ此ニ至リテ更ニ其間ニ再審ヲ要ス可キ事アルヲ知リシト雖モ未ダ遽ニ之レヲ筆ニスルニ及バズシテ以テ荏苒今日ニ至レリ頃日學友川上瀧彌氏ノ好意ニヨリ同氏自ラ明治三十一年八月十日千島國擇捉島アトイカ山二千尺ノ高處雪積ノ邊ニ於テ採集セラレタル一標品ヲ贈ラルヽニ會シ乃チ之レヲ檢スルニ及ンデ愈此ニ之レヲ訂正セザル可カラザルノ動機ヲ受クルニ至レリ而シテ今同氏寄贈ノ標品ヲ熟察スルニ是レ即チ眞正ノ Primula cuneifolia *Ledeb.* ニシテ *Lehmann* 氏ノ Primula saxifragifolia *Lehm.* ノ圖說モ亦之レト吻合シ *Ledebour* 氏ノ記文モ亦之レト契合ス乃チ疑フ上ノ *Franchet* 氏ノ Primula cuneifolia. ハ果シテ眞正ノ Primula cuneifolia *Ledeb.* 其物ニ非ラズシテ蓋シ Primula nipponica *Yatabe.* ヲ指セシナランヲ、而シテ其 *Franchet* 氏ノ標品ハ 1886 年七月六日 *Faurie* 氏ノ青森縣下八甲田山ニ於テ採集セル所ノ者ニ係リ其號數ハ正ニ 870 是ナリ

繇條書屋植物雜記中「日本產さくらさう屬中三種ノ記」（明治三十年三月刊行植物學雜誌第百廿一號 112—3頁、及ビ繇條書屋植物雜識卷之五 12—3 頁）ノ文中「（丙）即チひなざくらハ上ノ兩種ニ比シテ通體之ヨリ小シ」ノ行以下ノ廿一行ハ其行文中ニ錯誤ノ間ハレルヲ發見セルニヨリ今姑ク之ヲ抹殺シ去ル而シテ尙（乙）**Primula hakusanensis Franch.** ノ產地中渡島箱館ヲ除キ又（丙）**Primula cuneifolia Ledeb.** ヲ其下ノ三異名即チ *Primula cuneifolia* Duby; *Primula saxifragifolia* Lehmann. 及ビ *Primula hyperborea* Spreng. ヲ連子テ之レヲ除キ而シテ其 *Primula nipponica*

Yatabeヲ起シテ(丙)ノ正位ニ之レヲ置ク可シ又其産地中ノ千島ハ宜シク之レヲ除キ去ルヲ要ス今此ニ左ノ表ニ就テ之レヲ看レバ則チ其再訂ノ跡ハ明カニ之レヲ知ルヲ得ン

(1)花白色、花徑凡ソ一「センチメートル」許

Primula nipponica Yatabe. (和名)ひなざくら (産地)羽後鳥海山、羽前月山、陸中栗駒山(共ニ理科大學標品)、羽後森吉山(據川上瀧彌氏)

(1)花紫色、花徑一「センチメートル」ヨリ更ニ大ナリ

(2)葉ニ重鋸齒ヲ交ウ

(3)鋸齒鋭ニシテ三稜形、葉本楔形ヲナシテ下廣キ葉柄ト成ル、葉質ヤヽ厚シ

Primula hakusanensis Franch. (和名)なんきんこざくら (産地)加賀白山(同上)

(3)鋸齒不齊且ツ鈍平、葉本ハ狹長ナル葉柄ト成ル、葉質薄シ

Primula heterodonta Franch. (和名)みちのくこざくら (産地)陸奥岩木山(同上)

(2)葉ニ重鋸齒ヲ交ヘズシテ只粗齒ヲ列ス

Primula cuneifolia Ledeb. (和名)えぞこざくら(新稱) (産地)渡島箱館(同上)、千島(據宮部金吾氏及川上瀧彌氏)

○第十四回 (明治三十二年四月二十日刊行植物學雜誌第十三卷第百四十六號)

○五十八 いぬまき幷ニらかんまき

予先キニ Podocarpus macrophylla *D. Don.* 幷ニ Var. *β.* chinensis *Maxim.*(=*P. chinensis* Sweet) 二品ノ和名ヲ記シテ甲ヲまき一名ほんまき一名くさまきト云ヒ乙ヲいぬまきト云ヘリ然ルニ其名稱中ニハ穩當ナラザル者亦間ハレルヲ以テ今左ノ如ク之レヲ改訂セント欲ス

いぬまき　Podocarpus macrophylla D. Don.

らかんまき　Podocarpus macrophylla D. Don var. β. chinensis Maxim.

是レ小野蘭山口授「物品目錄記聞」ニ憑據シテ之レヲ定ム而シテ同書ノ文ニ曰ク

羅漢松　イヌマキ　又ラカンマキトモ云イヌマキハ葉大ニシテ實生セズラカンマキハ葉小ニシテ實生ズル也イヌマキモ大木ニナリテハ實生ズル也山中ナラデハナシ市中ニテハ實生セヌナリト、而シテいぬまきハ一ニくさまきト呼ブ大和本草ノ文ニ曰ク

……然ラハ杉ヲ古ニマキト云ルナラン杉ヲマキト云ニ對シテ羅漢松ハ犬マキト云今ハ只マキト稱ス故實ヲ失ヘリ西州ニハクサマキト云其臭クサケレハナリ……

ト而シテ從來本草家羅漢松ヲ取テ之レヲいぬまきニモ充ツ然レ𪜈嚴密ニ之レヲ言フ時ハ宜シク之レヲらかんまきノ漢名ト爲サヾル可ラズ

上記小野蘭山口授「物品目錄記聞」ハ世間稀有ノ一書ニシテ學友白井光太郎氏ノ珍藏スル所ナリ頃日予之レヲ借覽スルノ榮ヲ得テ以テ前記ノ如ク其名實ヲ訂スヲ得タリ此ニ以テ同氏ノ好意ヲ謝ス

○五十九　本邦植物ノ新和名

Iris iyoana Makino (sp. nov.)　えひめあやめ(新稱)　予ハ之レガ標品ヲ奥平幹一氏ニ得記文ハ別ニ公ニス可シ

Senebiera pinnatifida DC.　からくさがらし(新稱)　小笠原島ニ產ス

Lonicera affinis Hook. et Arn.　はまにんどう(新稱)

Peucedanum sp.　いしづちばうふう(新稱)　伊豫石鎚山頂ニ產ス其學名幷ニ記文ハ更ニ別ニ報ズ可シ

○六十　こしほがまノ新學名

予ハこしばがまノ學名ヲ左ノ如ク改訂セントス

Phteirospermum japonicum (Thunb.) m.

=*Gerardia japonica* Thunb. Fl. Jap. (1784) p. 251, et Icon. pl. Jap. Decas 5 (1805), tab. X.

=*Phteirospermum chinense* Bunge in Fisch. et Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. I. (1835) p. 35.

○六十一 Cardamine scutata *Thunb.* トハ何ゾヤ

Cardamine scutata *Thunb.* (in Trans. Linn. Soc. II. (1794) p. 339, et Icon. pl. Jap. Decas 3, tab. IX.) ナル一植物アリ從來諸學者之レヲ未詳品ノ一ニ算ス

今其圖說ヲ按ズルニ是レ蓋シたねつけばな即チ Cardamine hirsuta *Linn.* subsp. flexuosa *Hemsl.*(=*C. flexuosa* With. Bot. Arr. Brit. Pl. ed. 3, III. 1796, p. 578.=*C. sylvatica* Link, in Hoffm. Phyt. Blaett. I, 1803, p. 50.) ノ不完全品ナラン而シテたねつけばなノ溪流中等ニ生ゼシモノ夏時往々此ノ如キ形貌ヲナスコトアリ

○六十二 おほこけしのぶノ異名

おほこけしのぶハ Hymenophyllum flexile *Makino.* ニシテ予ハ既ニ此新學名ヲ公ニシタリ今其異名ヲ考フルニ蓋シ左ノ如ケン

Hymenophyllum flexile Makino in Bot. Mag., Tokyo, XIII, p. 45.

=*Hymenophyllum fimbriatum* Miq. Prol. fl. Jap. in Ann. Mus. bot. Lugd.-Bat. III. p. 183, non J. Sm. ?

=*Hymenophyllum javanicum* Franch. et Sav. Enum. pl. Jap. II. p. 206, non Spreng. excl. syn. ?

Hymenophyllum javanicum *Spreng.* ハ内地ニ見ズ而シテ琉球ニ產スしまゆきかづら(新稱)ト稱ス

○六十三 しまゆきかづら

予先キニ Pileostegia viburnoides *Hook. f. et Thoms.* var. parviflora *Oliv.* ヲ稱シテはひうつぎト呼ビタリ然ルニしまゆきかづら(田代安定氏命名)ノ名既ニ之レアリ由テ此ニはひうつぎノ名ヲ抹殺シ去ル本植物ハゆきのした科ニ屬シ我版圖内ニ在テハ臺灣幷ニ琉球ニ產ス

○六十四 やまるりさう幷ニひめとらのを

予先キニ明治廿九年絲條書屋植物雜記中ニ於テ聊カやまるりさう幷ニひめとらのをニ就テ記シタリシガ當時未ダ其ひめとらのをノ學名ヲ確定セザリシナリ由テ今左ニ之レヲ定ム

Veronica spuria Linn. α. paniculata Maxim. (和名)やまるりさう又やまとらのを

Veronica spuria Linn. β. angustifolia Benth. (和名)ひめとらのを

○第十五回 (明治三十二年五月二十日刊行植物學雜誌第十三卷第百四十七號)

○六十五 總苞ノ裂片變ジテ花瓣ト成ル

總苞ノ裂片變ジテ花瓣ト成リシモノ予頃日之レヲおやぶじらみ即チ Caucalis scabra (*Thunb.*) *Makino* (=*C. praetermissa* Hance) ニ見ル聊カ左ニ之レガ狀態ヲ記セン

おやぶじらみノ花瓣ハ五數アリテ大小往々不同ナリ而シテ花放ラキテ開展ス倒心臟形ニシテ下部楔形ヲ成ス頭端ノ兩耳片ハ圓頭ニシテ其一方ノ者ハ通常他ノ一方ノ者ヨリ大ナリ頂尖ハ内方ニ反屈シ狹クシテ鈍頭ヲ成ス上面ノ中央ニハ一條ノ縱畝アリ下面ニハ上向セル粗毛ヲ生ジ且ツ中部ノ方ニ向フテ差〻綠色ヲ呈ス瓣ノ全體ハ白色ニシテ紅暈アリ是レおやぶじらみ花瓣ノ狀態ナリ

同植物ノ花叢ハ複繖形ヲ成シ其大繖ノ基部ニ往々一二ノ總苞アリ其狀單一ニシテ線形ヲ成ス者アリ又分裂シテ葉狀

ニ發達セル者アリ而シテ分裂シテ將ニ葉狀ニ發達セント欲スル小形ノ者ニハ其最下部ノ裂片變ジテ白質ト成リ以テ紅暈ヲ帶ビ又中部綠色ヲ呈スル者アリ其形倒心臟形ニシテ頂尖花瓣ト同狀ヲ成シ以テ反屈シ且ツ背面ニ粗毛ヲ帶ビテ其形質總テ前記ノ花瓣ト同相ヲ呈セリ而シテ此ノ如ク瓣化セル局部ヲ有スル總苞片ハ其邊緣亦白色ヲ呈シテ瓣質ヲ成スコト是レ其常態ナリ

○六十六 らしゃうもんかづら ノ學名私考

らしゃうんかづらハ唇形科ノ一草ナリ予ハ今其學名ヲ新訂スルコト左ノ如シ

Meehania urticiforia (Miq.) Makino nom. nov.

=*Dracocephalum urticifolium* Miq. Prol. fl. Jap. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. II. p. 109; Franch. et Sav. Enum. pl. Jap. I. p. 375; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. XXVI. p. 293.

=*Nepeta urticæfolia* S. Moore in Journ. Bot. 1878, p. 129.

=*Cedronella urticifolia* Maxim. in Mél. Biol. XII. p. 528.

=*Dracocephalum sinense* S. Moore in Journ. Linn. Soc. XVII. p. 385, t. XVI. f. 7.

らしゃうもんかづらハ草質ノ多年生本ニシテ山地或ハ丘陵樹下ニ生ジ四月鮮紫色ノ美花ヲ開キ一種ノ香氣アリ花梗ハ直立シ上方花穗ヲ成シ花ヲ綴ル更ニ別ニ新莖ヲ株本ヨリ横出シテ葉ノミヲ着ケ愈長ジテ蔓狀ト成リ地上ニ横臥シテ節ヨリ根ヲ出シ後幾株ノ新本ヲ成形ス萼ハ綠色鐘狀ヲ成シ十五條許ノ縱脈ヲ有シ外面ニ疎毛アリ萼口ハ五裂シ裂片ハ卵圓形ヲ呈シテ頂ニ小尖點アリ花冠ハ長サ四半「センチメートル」許ニ達シ下部長ク狹窄シ上部放大ス花喉兩唇ニ分レ上唇ハ花冠筒ト同方向ヲナシテ淺ク兩裂シ裂片ハ圓頭ナリ內面ニ柔毛ヲ疎生ス下唇ハ三裂シ側片ハ鈍頭ヲ成ス而シテ中片最モ大ニシテ兩分シ側邊ニ齒アリ白色ニシテ紅紫點ヲ散布シ且立チタル白毛ヲ有ス雄蕋四數ニシテ下

方ノ者稍短シ花絲ハ絲狀ニシテ淡紫色ヲ呈シ葯ハ白色ニシテ葯胞稍平行ノ位置ヲ保ツ花柱ハ絲狀ヲナシテ微ニ雄蕋ヨリ高ク而シテ柱頭兩岐ス

本屬ノ者北米ニ一種ヲ產ス Meehania cordata *Britton*(=*Dracocephalum cordatum* Nutt. = *Cedronella cordata* Benth.)ト云フらしゃうもんかづらヨリ葉圓ク花少シク小ニ且ツ其蕚筒亦小ニシテ狹シ

○六十七 きよすみこけしのぶノ新產地

きよすみこけしのぶハ Hymenophyllum oligosorum *Makino*. 是ナリ此モノ房州淸澄山ニ產シ其他ノ產地ハ未ダ詳カナラザリシガ昨明治三十一年十月二十八日上州榛名神社ノ傍ニ於テ歸山信順氏之レヲ採集セラレ而シテ同氏ノ好意ニヨリテ予ハ其標品ノ寄贈ヲ受クルヲ得タリ此ニ此稀有羊齒ノ第二產地ヲ世ニ報ズ

○第十六回 (明治三十二年六月二十日刊行植物學雜誌第十三卷第百四十八號)

○六十八 日本產 Coptis 屬品種ノ評記

うまのあしがた(毛茛)科中本邦產わうれん屬(Coptis)諸品ノ檢定ハ予ハ誠ニ至難ノ業タルヲ感ズ其みつばわうれん即チ C. trifolia *Salisb.* 幷ニばいくわうれん即チ C. quinquefolia *Miq.* ノ兩種ハ敢テ他ト混ズルノ虞ナシト雖モ然モ其 C. anemonefolia *Sieb. et Zucc.* ト云ヒ其 C. brachypetata *Sieb. et Zucc.* ト云フ予ハ遂ニ截然タル界線ヲ其間ニ劃スル能ハズ而シテ殊ニ此兩品ノ花ニ在テハ予ハ遂ニ其兩種タルノ異同ヲ其上ニ認ムルナシ假令其前輩ノ說文ニ於テハ明カニ其異同アルヲ示セルガ如シト雖モ是レ寧ロ怪ム可キノ事ニ非ザルヲ知ル卽チ乾本ニ據ルト生本ニ據ルトハ亦其細微ノ異同ノ生ジ易キ原因ニシテ評定者此ノ如キ細微ノ點ヲ以テ品種ヲ分タントト欲セバ周到精緻ナル考ヲ其間ニ致サズンバ遂ニ其正鵠ヲ得ザルニ止マンノミ而シテ又 C. orientalis *Maxim.* 幷ニ先輩ノ C. occidentalis (*Nutt.*)

Torr. et Gray. ト爲セル本邦品種ノ如キ予ハ亦前掲兩品ト果シテ相分ツニ足ル可キヤ否ヤ大ニ疑ヲ其間ニ挿マザルヲ得ズ要スルニ上述四名ノ下ニ來リ歸ス可キ本邦所產ノ品種ハ予ハ想フ是レ只葉ニ變態多キ一個ノ品種ニ過ギザルノミト而シテ予ハ今之レヲ左ノ如ク爲サント欲スルナリ

Coptis japonica Makino nom. nov.

=*Didymamista Salviæ similis* Thunb. Fl. Jap. p. 364.

=*Thalictrum japonicum* Thunb. in Transact. Linn. Soc. II. p. 337.

=*C. racemosa* Sieb. herb.

=*C. anemonæfolia* Sieb. et Zucc. Fl. Jap. fam. nat. n. 329.

=*C. brachypetala* Sieb. et Zucc. l. c. n. 328.

=*C. orientalis* Maxim. Mél. biol. VI. p. 259.

=*C. occidentalis* Miq. Prol. p. 195. non Nutt. et Torr. et Gray?

今三出葉ヲ有スル きくばわうれん(即チ C. anemonæfolia *Sieb. et Zucc.* ノ本形品)ヲ取テ之レヲ再三全裂或ハ再羽狀全裂葉ヲ有スルほそばわうれん(卽チ C. brachypetala *Sieb. et Zucc.* ノ本形品)ト比較スルトキハ其葉形互ニ大ニ同ジカラズト雖モ多數ノ標品ヲ取リ來テ我前ニ展列スル時ハ其葉裂ノ狀實ニ多樣ニシテ遂ニ其間ニ判然タル區別ノ界線ヲ認ムル能ハザルニ至ラン而シテ從來稱スル所ノきくばわうれん、ながばわうれん、ほそばわうれん、せりばわうれん、おほばわうれん幷ニおほせりばわうれん等ハ必竟只其葉形ヲ異ニシタル一種タルニ外ナラザル可シ

○六十九 おほばしょうま幷ニみづふで

(一)おほばしょうま一名きけんしょうまノ學名ハ左ノ如シ

Cimicifuga japonica Spreng. Syst. Veget. II. p. 628.

=*Actæa japonica* Thunb. Fl. Jap. p. 221.

=*Pitylosperma acerinum* Sieb. et Zucc. Abhandl. III. p. 735, tab. 3.

=*Actæa acerina* Prantl.

=*C. japonica var. α. acerina* Huth in Engl. Bot. Jahrb. XVI. p. 316.

=*Cimicifuga japonica var. ternata* Maxim. in litt.

=*Thalictrodes japonicum* O. Kuntze.

=*Ōbashōma et Kikenshōma* Sōmoku-Dzusetsu, X. fol. 15 verso, et fol. 16 recto.

該種ハ其葉必ズ單一出ヲ成シ其小葉ノ底部時ニ或ハ楯形ヲ或ス此楯形ヲ成スノ狀況ハ此植物必至ノ常態ニ非ラズ從來C. obtusiloba *Miq.* ヲ以テ此種ヲ呼ビシト雖尾精檢ノ結果此ニ其然ルベカラザルヲ知ル

(二)みぐふで一名あはぼノ學名ハ左ノ如シ

Cimicifuga heterophylla Makino in Bot. Mag., Tokyo, XI. 1897, p. 248.

=*Pityrosperma obtusilobum* Sieb. et Zucc. l. c. p. 735.

=*Cimicifuga obtusiloba* Miq. Prol. fl. Jap. p. 197.

=*Actæa obtusiloba* Prantl.

=*Cimicifuga japonica var. β. obtusiloba* Huth l. c.

=*Thalictrodes obtusilobum* O. Kuntze.

=*Pitylosperma biternatum* Sieb. et Zucc. l. c. p. 736.

=*Cimicifuga biternata* Miq. l. c.

=*Actæa biternata* Prantl.

＝*Cimicifuga japonica var. biternata* Maxim. in litt.

＝*Mitsubashōma* Sōmoku-Dzusetsu X. fol. 14 recto.

＝*Iwashōma* l. c. fol. 15 recto.

＝*Midzufude* Honzō-Dzufu VII. fol. 19 verso.

本種ハ通常下部ノ葉ハ再三出ヲ成シ上部ノ者ハ單三出ヲ成ス又株ニヨリテハ上部下部共ニ單三出ノ葉ヲ出セルアリ又上部下部共ニ全ク再三出ノ葉ヲ出セルアリ又單三出葉ヨリ再三出葉ニ遞變セル葉ヲ見ルコト稀少ニアラズ C. obtusiloba (*Sieb. et Zucc.*) *Miq.* ノ如キ予ハ今親シク其標品ヲ見シニ非ラズト雖モ其記述文ニ據リテ之レヲ考フルニ其單三出ノ葉ニ就テ之レヲ記シタル者タルヤ殆ンド疑ヒヲ容レズ草木圖說卷之十ニ圖說セル三葉升麻及ビいぬ升麻ノ葉形ニ見レバ則チ明カニ其單三出ヨリ再三出ノ形ニ遞變セルノ狀ヲ看取スルヲ得可ク而シテ東京幷ニ其近郊ニハ至ル處ニ之レヲ得ルコト難カラザルヲ以テ實檢ノ資ヲ得ルモ亦甚ダ容易ナリ

上ノ兩品ニ就テハ先キニ植物學雜誌第百廿五號ニ於テ一タビ略說セシコトアリシト雖モ予ハ今此ニ再ビ之レヲ述ブルコトヲ敢テシタリ

○七十 日本產 Caltha 屬ノ品種

(一)莖肥大ニシテ直立シ葉ハ心臟底圓形ニシテ圓鈍齒緣ヲ成シ莖葉三乃至七片アリ莖梢ニ花多ク花徑三乃至四「センチメートル」アリ

Caltha palustris Linn. *α.* **typica Regel.**

えぞりうきんくわ(新稱)

(二)莖瘦長ニシテ葉ハ腎形ヲ成シ莖葉大抵一乃至三片アリ莖梢花稀少ニメ花徑ハ二乃至三「センチメートル」許ナリ

Caltha palustris Linn. var. β. sibirica Regel.

りうきんくわ
ゐんかうさう
こばのりうきんくわ
ノ品類皆當サニ此處ニ來ル可シ

此三品ニ就テノ詳細ナル記事ハ更ニ他日ヲ俟テ世ニ報ゼント欲ス

○七十一 えぞでんだノ產地

Polypodium vulgare Linn. ハ歐洲ニ在テハ最モ普通ナル一羊齒ナリト雖モ然モ本邦ニ在テハ極メテ稀少ノ品種ニ屬ス理科大學ニ一標品アリ宮部金吾氏ノ明治十七年七月十九日北海道北見國網走(アバシリ)ニ於テ採集セラレタル者ナリ而シテ和名ヲえぞでんだ(新稱)ト云フ

○第十七回 (明治三十二年七月二十日刊行植物學雜誌第十三卷第百四十九號)

○七十二 日本「フロラ」ノ新品こさんかくゐ

予頃日 Scirpus 即チふとゐ屬ノ一種ヲ東京ニ得タリ是レ本邦「フロラ」ノ一新品ニシテ乃チ之レヲ世上ニ報ズ可キノ價値アリ而シテ其學名ヲ Scirpus lacustris Linn. subsp. carinatus Syme. ト云フ Scirpus carinatus Sm. 及ビ Scirpus Duvalii Hoppe. 等ノ異名アリ新和名ヲこさんかくゐ(弧三角藺)ト稱ス

本品ハふとゐ、さんかくゐノ中間ニ位スル一種ニメ其莖ハ隆面鈍稜ノ三角狀ヲ成シ滑澤ニメ鮮綠色ヲ呈シ其大ふとゐヨリ小ナリ根莖ハ橫走シ莖本最上ノ鞘ニハ往々其頂ニ鍼狀ノ一小葉ヲ着ク花穗ハ一乃至數個ノ小穗相集リ一苞アリテ微ニ花穗ヨリ長シ小穗ニ有柄ノ者アリ無柄ノ者アリテ其形卵狀圓錐形ヲ成ス穎片ハ赤褐色ニシテ緣毛アリ背ノ中央縱脊ヲ成シテ綠采ヲ有ス囘頭ニシテ中央ニ微尖アリ花柱ハ兩岐シ花絲ハ絲狀ヲ成シテ葯頂ニ毛ナシ瘦果ハ一面

坦平ニシテ一面隆ク滑澤ニシテ長キ倒卵形ヲ呈ス鬚體ニ逆刺アリ

○七十三 のぶきノ新學名

のぶきノ學名左ノ左シ

Adenocaulon bicolor Hook. var. β. adhærescens (Maxim.) m.

=*Adenocaulon adhærescens* Maxim. Prim. Flor. Amur. p. 152.—Miq. Prol. Fl. Jap. p. 100.—Franch. et Sav. Enum. pl. Jap. I. p. 221.

○七十四 日本產 Cystopteris ノ二種

Cystopteris 屬ノ羊齒ハ本邦ニ產スル誠ニ稀少ニシテ而シテ其品種モ亦僅カニ二個ヲ算スルニ過ギズ一ヲ **Cystopteris japonica Luers.** ト云フうすひめわらび即チ是ナリ本邦西南地方ノ深山ニ產ス一ヲ **Cystopteris fragilis Bernh.** ト云フ新和名ヲなよしだト呼ブ北海道ニ產ス近日予ハ之レガ標品ヲ一知人ニ得タリ是レ野州庚申山ニ採ル所ナリ乃チ知ル本品亦尙本州ノ地ニ產スルアルヲ而シテ此種歐洲ニ在テハ極メテ普通ノ一品ニ屬セリ

○七十五 とさしもつけノ覆審

Spiræa bracteata Zabel var. tosaensis (Yatabe) = *S. tosaensis* Yatabe in Bot. Mag., Tokyo. VI. p. 58.

とさしもつけノ生本東京帝國大學理科大學附屬植物園ニ一株アリ本年五月花ヲ開ケリ乃チ予ハ其生本ニ觀テ之レヲ *S. bracteata Zabel.* (=*S. nipponica* Maxim.) 即チいはしもつけ一名こばのいはがさ一名まるばのいはがさニ比較スルニ只其葉ノ狹長ナル一事ヲ除クノ外各部ノ狀態兩者互ニ能ク相符合ス故ニ予ハ今とさしもつけ即チ *S. tosaensis Yatabe.* ヲ取テ上ノ如ク之レヲ *S. bracteata Zabel.* ノ一變種ニ收ムルヲ爲セリ而シテ其記文ハ更ニ我 Plantæ Japo-

nenses novæ vel minus cognitæ. 中ニ之レヲ掲出ス可キヲ期ス

○七十六 あぜおとぎりノ學名

Maximowicz 氏先キニあぜおとぎりヲ檢定シテ之レヲ Hypericum erectum *Thunb.* var. obtusifolium *Blume.* ナリト言ヘリ然ドモ予ハ本品ヲ以テ一新種ト考ヘ今左ノ學名ヲ新考セリ而シテ其說文ハ更ニ別題ノ下ニ之レヲ公ニセント欲ス

Hypericum flaccidum Makino sp. nov.

○七十七 新すみれ

東京近郊ノ樹下一種ノすみれヲ產ス其葉頗ル大ニシテ其花白ク全體ノ質柔ナリ根上能ク苗ヲ生ジ花後其葉大形ヲ成ス是レ一新種ノすみれニシテ新考ノ名稱即チ左ノ如シ說文ハ更ニ別題ノ下ニ之レヲ記セン

Viola flaccida Makino sp. nov.

ひかげすみれ(新稱)

○第十八回 (明治三十二年八月二十日刊行植物學雜誌第十三卷第百五十號)

○七十八 きっかふちくノ新訂學名

きっかふちくト稱スル竹アリ幹本ノ節崎形ヲ呈ス是レまうさうちくノ一變種ニ係ル即チ今其學名ヲ新訂スル左ノ如シ

Phyllostachys mitis Rivière var. heterocycla (Carr.) Makino.

=*Bambusa heterocycla.* Carrière in Rev. Hortic. 1878, p. 354.

=*Phyllostachys heterocycla* Mitf. Bamb. Gard. p. 160, cum icon.

○七十九 きんめいちくノ新訂學名

きんめいちくハまだけノ一變種ナリ即チ其新訂ノ學名左ノ如シ

Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc. var. castillonis Makino.

=*Bambusa castillonis* Hort.

=*Phyllostachys castillonis* Mitf. Bamb. Gard. p. 152.

○八十 うすゆきなぎノ新訂學名

予先キニうすゆきなぎノなぎノ一變種タルヲ言フ今其新訂ノ學名ヲ作レバ實ニ左ノ如シ

Podocarpus Nageia R. Br. var. caesia (Maxim.) m.

=*Podocarpus caesia* Maxim. in Mél. biol. VII. p. 561.

本品其葉霜ヲ帶ビテ白綠色ヲ呈ス由テ薄雪なぎト云フ時ニ人家ニ栽植スルヲ見ル

○八十一 Phyllospadix 屬ノ二種本邦ニ產ス

Phyllospadix 屬ノ二種正ニ我日本ニ產ス去ル明治二十九年四月予其一種ヲ房州ノ海ニ採リシ以來專ラ其材料ヲ蒐ムルニ努メタリシガ田中芳男氏ニヨリテ陸中地方ヨリ貴重ノ標品ヲ得又北海道札幌農學校在學ノ川上瀧彌氏ニヨリテ北海道所產ノ標品ヲ得又伊藤篤太郎氏ニヨリテ清國ノ海ニ採リタル標品ヲ得以テ彼此稽查ノ便ヲ得シコト少ナカラズ此ニ以テ諸氏ノ厚意ヲ多謝セズンバアラザルナリ

此ニ諸處ヨリ得タル標品ニ就テ調查シ之レヲ稽フルニ本邦ニ產スル該屬ノ者ニハ明カニ二種アリテ存スルヲ知ルナリ

其一ハ予ノ先キニ明治三十年四月刊行植物學雜誌第百二十二號ニ於テ公ニシタル一種ニシテ東海道ノ沿岸幷ニ中國日本海ノ海岸ニ產ス其葉中央ニ一脈ヲ通ジ葉纖維ノ枯殘セル者暗黑色ヲ呈ス而シテ其學名和名ハ左ノ如シ

Phyllospadix japonica Makino in Bot. Mag., Tokyo, XI. 1897, p. 137.

Jap. *Ebi-amamo* (T. Makino).

其二ハ即チすがもニシテ田中芳男氏ノ植物學雜誌第百二十三號ニ其說ヲ揭ゲラレシ品ナリ（但シ文中島根、鳥取兩縣及ビ安房、伊豆、相摸、三河、志摩ノ品ヲ除ク）是レ予ノ同先生ノ說文ニ追記シテ「其陸中釜石產ノ一種ハ全ク異リタル種徵ヲ具ヘ以テ特別ノ一品ヲナス云々」ト言ヒタル者ト同種ニシテ陸中附近幷ニ北海道ニ產ス而シテ更ニ之レヲ清國芝罘（チーフー）ノ海岸ニ見ル是レ前述伊藤氏ノ贈ラレタル標品ノ證明スル所ニシテ其清國ニ產スルノ事實タル殊ニ之レヲ特筆スルノ價値アリ其葉脈中央ニ三道縱通シ葉纖維ノ枯殘セル者ハ茶褐色ヲ呈ス而シテ花ハ能ク前種ニ類似スすがもナル呼名ノ外尙ホうみすげ、ごもくさ及ビはまくさノ方言アリ其學名等實ニ左ノ如シ

Phyllospadix Scouleri Hook. Fl. Bor. Amer. II. p. 171, t. 186.

Jap. *Sugamo, umisuge, gomokusa, hamakusa.*

Distrib. North America. China : Chefoo (Leg. Yoshi Itō ! Sept. 25, 1897, commun. T. Itō).

予ハ今此ニ本邦「フロラ」ニ算入シテ光采ヲ添フ可キ此兩品ヲ略說セリ而シテ更ニ其詳說ナカル可ラズ其ハ他日ノ成文ニ俟ツノミ

○八十二 なんたいしだノ學名如何

Nephrodium Maximowiczii Baker. (=*Aspidium sanctum* Maxim. =*Aspidium commutatum* Fr. et Sav.)

ハ *Baker* 氏ノ記文ニ據レバ能クなんたいしだ即チ Aspidium callopsis *Fr. et Sav.* ト相合フ而シテ *Franchet* 氏ハ

羽片幷ニ小羽片ノ形狀相異ナリト爲シ以テ別ニA. callopsis *Fr. et Sav.* ヲ建ツ然ドモ予ハ今之レヲ合スルヲ以テ正鵠ヲ得タル者タルコトヲ信ズルナリ

○八十三 くまのみづきノ學名

Cornus brachypoda *C. A. Mey.* ノ以テ Cornus macrophylla *Wall.* ニ非ズシテ全ク別種ニ屬セル品タルコトハ 1897 年 *E. Koehne* 氏ノ研究セシ所ニヨリテ特ニ明瞭トナリシト雖ドモ一タビハ西人兩者ヲ混淆シテ一種ノ者ナリト考ヘシナリ本邦ノ植物學者ハ固ヨリ之ヲ混視セシニ非ラズト雖ドモ其學名ヲ確定スルニハ頗ル拙ナリシヲ免カレザリシナリ而シテ *Koehne* 氏ノ論文一タビ出デテ之レヲ歐洲ノ土ニ唱ヘ西人ヲシテ其據ル所ヲ得セシメシト雖ドモ吾人ハ固ト始メヨリ其二種アルヲ的知セルモノ只今此ニ其論文ヲ見テ首肯スルニ過ギザルノミ

Cornus brachypoda C. A. Mey. ハ西暦一千八百四十五年 *C. A. Meyer* 氏ガ其著 Über einige Cornus-Arten. ノ第三十二頁ニ於テ始テ命名シ以テ記述セル一種ニシテ其葉對生シ葉底狹窄シ葉頭長ク鋭尖ヲ成ス而シテ此種ハ吾人稱スル所ノくまのみづきニシテ本邦中部以南ノ山地ニ產シ敢テ珍トスル樹木ニアラズ又淸國湖北省ニ產ス即チ *Henry* 氏ノ採ル所ニ係ル

○第十九回 (明治三十二年九月二十日刊行植物學雜誌第十三卷第百五十一號)

○八十四 ひめさゆり(新稱)ノ記

頃日羽前國米澤尋常中學與讓館敎員中村正雄氏ノ好意ニヨリテ此ニ百合ノ一種ヲ得タリ是レ同氏ノ本年六月十七日同國ノ南境吾妻山ノ中腹草中、上ハ直チニぶな帶ニ接スル地ニ在テ採集スル所ニ係リ從來晉通ニ吾人ノ間ニ知ラレザル一種ニ屬シ只僅ニ本草圖譜卷五十一ニ之レガ圖說アルヲ見ルニ過ギズ而シテ同書ニハさゆりノ名ヲ之レニ附シ

且ツ之レヲ略説シテ「南部の産也葉はたもとゆりに似て高さ七八寸三四月花を開く淡紅色にして側に向ふ根白く小し百合の中にて花を早く開くゆへさゆりと云」ト云ヘリ是レ蓋シ本州北地ノ一品ニ屬ス

昨年 (1898) *J. G. Baker* 氏始メテ之レヲ The Gardeners' Chronicle 誌上ニ記載シ以テ

Lilium rubellum Baker (in Gard. Chron. 1898, II. p. 321, fig. 128.)

ナル新學名ヲ公ニシ後更ニ Curtis's Botanical Magazine, tab. 7634. ニ於テ再説シ以テ美麗ナル寫生圖ヲ附セリ

予ハ始メテ其 *Baker* 氏ノ圖説ニ逢フヤ甚ダ其實物ヲ見ンコトヲ希ヒタリ而シテ今ヤ端ナク之レヲ中村氏ニ得タルヲ喜ブ本草圖譜之レヲさゆりト云フ其名殊ニ其一品ヲ指稱スルニ適切ナラズ由テ予ハ今新ニ之レヲ姫さゆりト稱セント欲ス而シテ其姉妹品 Lilium japonicum *Thunb.* 即チさゝゆりト異ナルノ点ハ主トシテ全體矮小ニシテ而シテ其葉幅廣キニ在リ

Baker 氏其形狀ヲ記ス曰ク鱗莖ハ球形、中等大、鱗片ハ多數、披針形。莖ハ細長、圓柱形、綠色、紅褐色ノ細点アリ通ジテ疎ニ葉ヲ着ク。葉ハ總テ互生シ一莖上約ソ二十片許アリ、長楕圓披針形或ハ披針形、二乃至三英寸長、强質、鮮綠色、分明ニ三脈或ハ五脈ヲ引ク。花ハ寡數、繖房狀、花蓋ハ漏斗形、紅色、無斑點、三英寸長、花徑三英寸、花蓋片ハ倒披針狀長楕圓形、鈍頭、上半ハ平開ス、內片三個ハ一英寸幅ニシテ外片ハ之ヨリ狹シ。雄蕋ハ花蓋ノ半長ヨリ更ニ短ク、葯ハ細小、線形、鮮黃色。花柱弓曲、大ニ葯ヨリ長シ。ト

○八十五 さださうノ名ヲ得タリ

さださうハ佐多草ノ義ナリ大隅國佐多岬ニ産スルヨリ名ク而シテ嘉永安政ノ年間早ク已ニ此名ヲ稱ス即チこせう科中 Peperomia portulacoides *Dietr.* ノ和名ナリ頃日該名ヲ得タリ乃チ宜シク此ニすなごぜうノ名ヲ廢シテ以テ該名ヲ立ツ可キナリ

○八十六 しばちくノ新訂學名

しばちくハしわちくト呼ブ即チ皺竹ノ義ナリ其稈面縱皺アリ淡路、阿波及ビ土佐ニ產シまだけノ一品ニ屬ス其新訂ノ學名左ノ如シ

Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc. var. Marliacea Makino.

= *Bambusa Marliacea* Hort.

= *Phyllostachys Marliaacea* Mitf. Bamb. Gard. p. 158.

○八十七 はてるまかづらノ學名

予頃日偶〻 *J. Britton* 氏出版ノ The Journal of Botany 第二十八卷 (1890年刊行) ヲ閲シテ *W. Botting Hemsley* 氏ノ On an Obscure Species of Triumfetta ナル論文ニ見以テはてるまかづらノ學名ヲ見出シタルト同時ニ予ノ曩ニ黑岩恒氏採集琉球植物(植物學雜誌第十卷第百十四號)中本品ニ宛テタル Triumfetta semitriloba *Jucq.* ハ全ク別植物ニシテ決シテ之レニ充ツ可キ者ニ非ザルコトヲ知ルヲ得タリ而シテ其正當ナル學名ハ實ニ左ノ如シ

Triumfetta procumbens Forst. Prodr. Fl. Ins. Austral. p. 35. — DC. Prodr. I. p. 508. — Pers. Syn. Pl. II. p. 5. — Guill. Zeph. Tait. p. 71. — A. Gray, Bot. Wilkes, p. 197. — Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 60. —Seem. Fl. Vit. p. 26. — Benth. Fl. Austral. I. p. 273 (pro parte). — Hemsl. in Journ. Bot. 1890, p. 2. t. 293, f. 2.

=*T. crassifolia* Soland. Prim. Fl. Pacif. p. 250.

=? *T. Fabreana* Gaud. Bot. Voy. Freyc. p. 478, t. 102.

=*T. semitriloba* Makino in Bot. Mag., Tokyo, X. p. 57 (non Jacq.).

本品ハ明治十八年七月八重山列島中ノ波照間島ニ於テ田代安定氏ノ檢出スル所ニシテ其和名はてるまかづらハ同氏ノ命ゼラシ所ノ者ナリ黑岩恒氏ハ明治廿六年四月之レヲ慶伊島ニ得又本年一月之レヲ石垣島ニ得ラレタリ而シテ本種ハ恒ニ海濱ニ生ジ其散布頗ル廣大ナル一品ニ屬シ馬來群島ヲ中心トシ西ハ「セイゲルス」諸島ニ至リ東ハ大洋洲ノ西部ニ亘リ南ハ濠洲「クイーンスランド」近海ノ一島ニ及ビ北ハ我琉球之ガ北境ヲ爲セリ

○第二十回（明治三十二年十月二十日刊行植物雜誌第十三卷第百五十二號）

○八十八 まねきぐさノ學名

まねきぐさハ又やませきわたト云フ即チ草木圖說新訂版ノ補入セル所ニ係リ其原版ニハ本ト此名アルナシ本邦中部地方ノ山地ニ產シ初秋ノ候花ヲ發ラク予ハ名倉間一郎氏ノ厚意ニヨリ始メテ之レヲ實檢スルノ資ヲ得タリ今其學名ヲ定ムル左ノ如シ

Leonurus ambigium Makino. sp. nov.

Perennial. Stem erect, quadriangular, pubescent, ramose, 3-6 decim. high. Leaves opposite, petiolate, ovate, coarsely serrate, with prominent and reticulated veins, pubescent. Flower solitary in each leaf-axil, erect-patent. Calyx 5-fid; lobes with the sharp tip,lower 2 longer; tube oblong, enlarged upwards. Corolla much ex-serted, purple, ringent; lower lip 3-parted. Nutlet black, obtuse at the top.

Hab. Prov. Mikawa (*G. Nagura!*).

Jap. *Manekı-gusa, Yama-kisewata.*

其詳說ハ更ニ別題ノ下ニ之レヲ揭ゲント欲ス故ヲ以テ今ハ只其新學名及ビ其梗概ヲ報ズルニ止メシナリ

○八十九 おろしまちくノ學名

おろしまちくハ矮小ナル竹品ニシテ往々之レヲ園裏ニ見ル今其學名ヲ擧グレバ實ニ左ノ如シ

Arundinaria pygmæa F.-Mitf. Bamb. Gard. p. 49, 50.(=*Bambusa pygmæa* Miq. Prol. fl. Jap. p.174.)

○九十 日本產うまのあしがた屬ノ諸種

(1)水草ニシテ莖葉全ク水中ニ沈在ス。葉ハ鬚髮狀多裂。白花……一、ばいくゎも

(1)陸生或ハ濕地生ニシテ莖葉全ク氣中ニ在リ。葉ハ平扁罕ニ線形ニシテ鬚髮狀ヲ成サズ。黃花……(2)

(2)葉ハ分裂セズ、小本……(3)

(2)葉ハ分裂ス……(4)

(3)叢生本ニシテ直上ス。葉ハ長柄ヲ有シテ橢圓形ヲ成ス……二、ひめきんぽうげ

(3)匍匐本ニシテ纖莖ヲ引ク。葉ハ線形或ハ絲狀……三、いときんばうげ

(4)根ハ紡錘狀。根葉三裂、裂片ハ底部狹窄ス。往々一株數莖ヲ出ス。小本……四、ひきのかさ

(4)根ハ鬚狀……(5)

(5)葉ハ掌狀三深裂、或ハ三尖裂……(6)

(5)葉ハ三全裂……(8)

(6)水濕地ノ二年生。體上無毛。光澤、柔輭、莖太クシテ筒ヲ成ス。葉ハ三深裂、裂片ノ分耳鈍頭。花徑五乃至七「ミ、メ」、花瓣微ニ萼ヨリ長シ。瘦果細微、一「ミ、メ」ニ充タズ。果毬長橢圓狀穗形……五、たがらし

(6)乾地生ノ多年生。體上毛ヲ有シ且ツ光滑ナラズ。莖瘦長、硬質。葉ハ三深裂或ハ三尖裂、裂片尖裂シ其尖裂片ハ尖鋸齒ヲ成ス。花徑十五乃至二十三「ミ、メ」、花瓣ハ著シク萼ヨリ長大ナリ。瘦果二「ミ、メ」徑。果毬球

形……(7)

(7)葉柄幷ニ莖ノ毛ハ平布ス或ハ毛極メテ寡シ……六、みやまきんぽうげ

(7)葉柄幷ニ莖ノ下部ノ毛ハ直出ス……七、うまのあしがた

(8)長匐枝ヲ發出ス。葉ノ裂片深裂或ハ全裂、裂片再ビ尖裂シ尖裂片更ニ尖齒ヲ有シテ瘦尖ス。花梗ニ條溝アリ。果毬球形……八、はひきんぽうげ

(8)匐枝ナシ……(9)

(9)果毬球形……(10)

(9)果毬長橢圓形、瘦果ノ嘴ハ短クシテ直シ。葉ノ裂片ノ狀宛モをとこぜりノ如シ……九、こきつねのぼたん

(10)葉ノ裂片卵形、二乃至三尖裂或ハ二乃至三深裂、粗鋸齒緣……(11)

(10)葉ノ裂片二乃至三全裂、裂片尖頭瘦線形ニ尖裂シ尖齒ヲ有ス。瘦果ノ嘴ハ直シ……十、をとこぜり

(11)花梗ハ一梗毎ニ葉ニ對シテ出デ果梗ハ横向ス。瘦果ノ嘴ハ頂ヤヽ曲ル……十一、しまきつねのぼたん

(11)花序ハ梢頭ニ枝ヲ分ツ。果梗ハ直立。瘦果ノ嘴ハ略鈎狀ヲ成ス……十二、きつねのぼたん

1. **Ranunculus aquatilis Linn. var. flaccidus Maxim. forma Drouetii Hiern.** ばいくゎも

2. **Ranunculus sp.** ひめきんぽうげ

學名幷ニ說文ハ近日更ニ別題ノ下ニ之レヲ揭グ可シ而シテ R. Cymbalaria *Pursh.* ト相分ツニ足ル可キノ一品ニ屬ス川上瀧彌氏ノ發見採集スル所ナリ

3. **Ranunculus Flammula Linn. var. reptans Sm.** いときんぽうげ

4. **Ranunculus ternatus Thunb.** ひめのかも

5. Ranunculus sceleratus Linn. たがらし
6. Ranunculus acris Linn. var. β. Steveni Reg. みやまんぼうげ
7. Ranunculus acris Linn. var. γ. japonica Maxim. うまのあしがた
8. Ranunculus repens Linn. はいまんぼうげ
9. Ranunculus chinensis Bunge. こまつねのぼたん
10. Ranunculus Tachirei Fr. et Sav. をとこぜり
11. Ranunculus Sieboldii Miq. しまつねのぼたん
12. Ranunculus japonicus Langsd. まつねのぼたん

○第二十一回（明治三十二年十一月二十日刊行植物雜誌第十三卷第百五十三號）

○九十一 とけんらんノ學名

本邦蘭品中とけんらんアリ稀有ノ一品ニ屬ス予曩ニ川上瀧彌氏ノ好意ニヨリテ其北海道ノ標品ヲ得以テ之レヲ檢定シ之レガ新學名幷ニ其說文ヲ公ニセント欲スルニ際シ池野成一郎氏ノ好意ニヨリテ佛國出版ノ一雜誌ヲ見ルヲ得此ニ端ナク其既設ノ學名アルヲ知ルニ至レリ即チ

Oreorchis unguiculata Finet.

是レナリ是レ 1896 年 *E.-Ach. Finet* 氏ノ命名シテ以テ世ニ報ゼシ所ノモノナリ

予ハ今其實物ヲ親檢シ又 *Finet* 氏ノ圖說ニ參照シ以テ之レヲ考フルニ是レ果シテ Oreorchis 屬ノ者タルヤ甚ダ疑ハシ *Finet* 氏既ニ "an genus novum ?" ト唱ヘシ如ク予モ亦應ニ此ノ如ク發言セント欲ス而シテ其植物ノ外觀ハ極メテ能

ク Oreorchis 屬ニ肖似スト雖ドモ然ドモ其牌瓣幷ニ花粉塊ノ狀態ハ殊ニ其屬ノ諸種ト一致セズ而シテ寧ロ Cremastra 即チさいはいらん屬ニ近似スト稱スベシ予ハ今其委曲ヲ世ニ報ゼント欲スト雖ドモ予ガ標品花粉塊皆散逸シ去リ充分其檢定ヲ了スル能ハズ止ムナク更ニ新標品ヲ得ルノ日ヲ待ツアルニ至レリ四方同好ノ士若シ多ク本品ヲ得ルアレバ則チ此ニ其花ノ幾分ヲ割愛惠贈セラレンコト斯學ノ爲メニ切ニ希望スル所ナリ

○九十二 かざぐるま及ばいくわもノ新產地

備中國高梁町日暮舍吉野善介氏ノ報ゼラルヽ所及ビ其惠贈セラレタル標品ニヨリテ予ハ此ニかざぐるま幷ニばいくわもノ亦中國ノ地ニ產スルアルヲ知レリ而シテ其かざぐるまノ自生地ハ本邦中甚ダ多カラズ予ハ只僅ニ土佐國高知近傍ニ之レヲ生ズルヲ知リ得タルノミナリシガ今吉野氏ノ爲メニ更ニ此ニ其新產地ヲ得タルヲ喜ブ

本年七月十五日同氏ノ書信ノ一節ニ言フ「迂生本年五月近鄕旅行の際當國上房郡津川村字狐谷の山中及同村內なる八川地方に於てかざぐるまの美花を開て野生するを目擊致直に採收致候」ト以テ同地方ニ其野生品アルヲ知ルニ足ル可シ

ばいくわも又之レヲ中國ニ得タルハ亦聊カ記スルニ足ル即チ其產地ハ同國哲多郡萬歲村大字矢土近傍ノ小流ニシテ吉野氏ノ報ズル所ニヨレバ「其地方には一體に產するやに聞及方言「うま芹」と稱へ土民は藥用に供し候よし」ト言ヘリ

○九十三 かんざんちく及ビたいみんちく

かんざんちく及ビたいみんちくハ內地ニ自然生ナシ唯往々庭際ニ栽エテ之レヲ賞スルニ過ギズ是レ Arundinaria Hindsii Munro. ナリ

かんざんちくハ其狹葉ノ品ヲ云フ(Var. graminea)其葉梢ニ多ク生ジテ甚ダ繁シたいみんちくハ闊葉品ヲ云フ然ル

ニ民間此稱呼往々轉倒シ狹葉品ヲたいみんちくト云ヒ闊葉品ヲかんざんちくト云フ

○九十四 せきこくノ學名

曩ニ天台杉浦重剛先生朝鮮國產スル所ノ石斛ノ生苗ヲ贈ラル就テ之レヲ見ルニ是レ本邦所產ノ石斛ト同種ニ屬セリ乃チ由テ朝鮮ノ地亦之レヲ產スルヲ知レリ此ニ先生ノ好意ヲ感謝シ其標品ハ永ク我 Herbarium 中ニ保存スルノ用意ヲ爲セリ而シテ寺崎留吉氏更ニ先生ニ受クル所ヲ博物學雜誌上ニ圖說シ以テ其形狀ヲ世ニ明ニス

石斛ノ學名ヲ定ムルニ兩說アリ即チ一ハ之ヲ取テ以テ之レヲ *Swartz* 氏所名ノ Dendrobium moniliforme *Sw.* ト爲シ一ハ即チ之レヲ否定シ Dendrobium japonicum (*Bl.*) *Lindl.* ヲ以テ之レニ代フ而シテ其 D. japonicum *Lindl.* ト爲ス所以ノ者ハ其 D. moniliforme *Sw.* ノ原文殊ニ簡約ニ失シテ以テ其的物ヲ模索スルニ苦ムト言フニ在リ即チ *Curtis's* Botanical Magazine tab. 5482. ノ說ノ如キ是ナリ然ドモ予ハせきこくヲ以テ Dendrobium moniliforme *Sw.* ト爲スノ理由アルヲ認ムルヲ以テ今其甲說ニ從ヒ且ツ併セテ其乙說ノ學名ヲ其異名ニ收ムルコトヲ爲セリ即チ左ノ如シ

Dendrobium moniliforme Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. VI. (1799) p. 85—Willd. Sp. Pl. IV. (1805) p. 136. — Spreng. Syst. veget. III. p. 738.—Pers. Syn. pl. II. p. 523.— Lindl. Gen. et Sp. Orchid. p. 83.—Miq. Cat. Mus. Lugd.-Bat. Fl. Jap. p. 101.—Fr. et Sav. En. pl. Jap. II. p. 25

=*Epidendrum moniliforme* Linn. Sp. pl. p. 954.

=*Epidendrum monile* Thunb. Fl. Jap. p. 30.

=*Dendrobinm japonicum* Lindl. Gen. et Sp. Orchid. p. 89.— Reichb. fil. in Annal. Bot. Syst. VI. p. 294.— Miq. Cat. Mus. Lugd.-Bat. Fl. Jap. p. 101. — Id. Prol. Fl. Jap. p. 135. — Bot. Mag. t. 5482 (1864). — Veitch Man. Orchid. pl. I. Dendrobieæ p. 51.

=*Onychium japonicum* Bl. Bijd. p. 328.

=*Dendrobium catenatum* Lindl. Gen. et Sp. Orchid. p. 84. — Gray in Perry's Exp. Jap. p. 319.

=*Dendrobium castum* Batem. ex Hook.

=*Fu Ran* Kæmpf. Amœn. exotic. p. 864 cum icon (dextra).

Kæmpfer 氏ノ圖スル所ハ一圖版ノ中ニ二種ノ植物ヲ含ム風蘭(Fu Ran)ヲ以テ之レニ題スト雖ドモ然ドモ其右者ハ石斛即チ Dendrobium moniliforme *Sw.* ニシテ左者是レ風蘭(Angræcum falcatum *Benth. et Hook. f.*)其物ナリ *Kæmpfer* 氏偶マ此二種ヲ混同セルナリ

Curtis's Botanical Magazine tab. 4153. ノ植物ニ Dendrobium moniliforme *Sw.* ノ名ヲ附シアリト雖ドモ是レ全ク石斛ニアラズ而シテ支那并ニ日本ニ產スト記セリト雖ドモ其日本ニ產スルコトハ蓋シ石斛ト混同シタル訛傳ニ出ヅ *W. J. Hooker* 氏其下ニ *Kæmpfer* 氏 Amœnitarum exoticarum 中ノ *Fu Ran* 全部ヲ引用スルハ是ニ非ラズ本植物ハ是レ D. moniliforme *Sw.* ニ非ラズシテ D. Linawianum *Reichb. fil.* 即チ是ナリ

○第二十二回 (明治三十二年十二月二十日刊行植物雜誌第十三卷第百五十四號)

○九十五 はちく小記

現今歐洲ニ於テはちくノ學名トシテ Phyllostachys Henonis *Bean* (=*Bambusa Henonis* Hort.) ヲ用ウ然ドモ予ハ Phyllostachys puberula *Munro* (=*Bambusa puberula* Miq.) ヲ以テ其學名トシテ用ウルノ佳ナルヲ感ズ然ルニ該名ハ P. nigra *Munro*. 即チくろちくノ異名トシテ認ラルヽヲ常トスト雖ドモ *Miquel* 氏ノ原文ハ必ズシモ P. nigra *Munro*. ナラズ元來くろちくハはちくノ一變種ノミ此兩品ハ別種ニ非ズ故ニ其枝葉等ノ相類セルコト尠少ニ非ズシテ殆ン

ド全ク相一致セリ此ノ如キヨリシテ *Miquel* 氏ノ品ヲ以テくろちくト同品ト爲セシニ非ラザル乎而シテ *Miquel* 氏ノ文中遂ニくろちくタルヲ認ムルニ由ナキモ乃チはちくタルヲ認ムルノ餘地ハ充分ニ之アリ故ニ予ハ *Miquel* 氏ノ Bambusa puberula 即チ Phyllostachys puberula *Munro* ヲ以テ淡竹即チはちくヲ呼ビ而シテ上ノ B. Henonis *Hort.* 即チ P. Henonis *Bean.* ヲ以テ之レガ異名 (Synonym) タラシメント欲スルナリ

○九十六 るりやなぎノ學名

るりやなぎハなす科ニ屬シ柔軟ナル灌木ヲナシ往々民間ニ栽ウルヲ見ル固ト南米「ブラジル」國ノ產ニシテ其學名ヲ Solanum glaucum *Dun.* (in DC. Prodr. XIII. 1, p. 100.) トス

○九十七 日本產ねこのめさうノ品名

A. Franchet 氏著ハス所ノ Monographie du genre Chrysosplenium. ハ誠ニ尊重ス可キ一書ニシテ本邦產ねこのめさうノ諸種其中ニ圖說セラレ一目ノ下ニ瞭然タリ今此ニ其邦產ニ係ル諸種ノ品名ヲ拔萃セバ實ニ左ノ如シ

CHRYSOSPLENIUM *Tourn.*

C. alternifolium *Linn.* var. β. japonicum *Maxim.* (=*C. alternifolium var. β. papillosa* Fr. et Sav. =*C. alternans* Thunb.)

C. flagelliferum *Fr. Schmidt.*

C. ramosum *Maxim.* (=*C. oppositifolium* Trautv. et Mey. =*C. yesoense* Fr. et Sav.)

C. Grayanum *Maxim.* (=*C. ovalifolium* A. Gray.)

α. polysticha *Franch.*

β. Dickinsii *Fr. et Sav.* (=*C. Dickinsii* Fr. et Sav.)

γ. nipponica *Fr. et Sav.* (=*C. nipponicum* Fr. et Sav.)

C. rhabdospermum *Maxim.*

C. echinulatum *Fr. et Sav.*

C. Echinus *Maxim.*

C. kamtschaticum *Fisch.* (=*C. oppositifolium* Cham. et Schlect.)

C. costulatum *Franch.* (=*C. corrugatum* Fr. =*C. nodulosum* Fr.)

C. aomorense *Franch.*

C. crenulatum *Franch.*

C. macrostemon *Maxim.* (=*C. ovalifolium* Miq.)

C. bicolor *Franch. et Sav.*

C. Calcitrapa *Franch.*

C. Fauriei *Franch.*

C. shiobarense *Franch.*

C. Maximowiczii *Franch. et .Sav.*

C. Vidalii *Fr. et Sav.*

C. sphærospermum *Maxim.* (= *C. sphærocarpum* Franch. = *C. multicaule* Fr. et Sav. = *C. sp. nov.* Baker et S. Moore.)

C. stamineum *Franch.*

C. album *Maxim.* (=*C. alternifolium forma minor* Miq.)

通計二十有一種皆一國ノ產ナリ而シテ其多種ナル能ク他邦ノ及ブ所ニ非ラズ亦盛ナリト謂フ可シ

明治三十三年二月十八日印刷
明治三十三年二月廿二日發行

正價金貳拾錢

著作兼發行者　牧野富太郎
東京市小石川區表町百九番地

印刷者　野村宗十郎
東京市京橋區築地三丁目十五番地

印刷所　株式會社東京築地活版製造所
東京市京橋區築地二丁目十七番地

發行所　合資會社敬業社
東京市神田區裏神保町一番地

CONTRIBUTIONS

TO THE STUDY OF

THE FLORA OF JAPAN.

XII-XXII. 1899.

By

T. Makino,

Assistant of Botany in the Science College,
Imperial University, Tokyo.

Reprinted from the Botanical Magazine, Tokyo, 1899.

TOKYO:

KEIGYŌSHA & Co.

1, Urazimbōchō, Kanda.

1900.